



# Argentina

Revisión de WUENIC 2025,  
Publicado el 15 de julio de 2026



Traducido con DeepL API Pro

# Estimaciones OMS/UNICEF de la cobertura nacional de inmunización (WUENIC), revisión 2025

Cada año, la OMS y el UNICEF examinan conjuntamente los datos de cobertura nacional de inmunización, compartidos por los Estados Miembros, incluyendo la cobertura oficial y administrativa anual, reportes de encuestas completadas y cifras de publicaciones de literatura gris. Los datos son triangulados, considerando la existencia de posibles sesgos y se toman en cuenta opiniones de expertos locales para diferenciar entre datos empíricos\* que reflejen con precisión el contexto, y depurar datos que conduzcan a una interpretación errónea ; con el fin de evaluar los niveles de cobertura más probables de cada país.

La OMS y UNICEF elaboran estimaciones específicas para cada país revisando los datos de cada país de forma independiente, sin recurrir a los datos de otros países cuando faltan datos. Las estimaciones no son ajustes ad hoc de las cifras comunicadas y pueden basarse en una única fuente empírica, normalmente la cobertura comunicada a nivel nacional. Cuando no se dispone de datos para un país, una vacuna o un año concretos, se interpolan los datos anteriores y posteriores. Si las fuentes entran en conflicto o varían mucho, se selecciona la estimación más plausible tras considerar los posibles sesgos.

Esta presentación muestra las últimas estimaciones de la WUENIC (publicadas el 15 de julio de 2026), utilizando las Perspectivas de la Población Mundial de la UNPD (WPP 2024) para obtener los promedios ponderados por población y derivar las cifras absolutas de niños vacunados y no vacunados/sin dosis.

Métodos: • [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes.](#)

- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach.](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage.](#)
- [Danovaro-Holliday et al. 2021. Compliance of WUENIC with Guidelines for Accurate and Transparent Health Estimates Reporting \(GATHER\) criteria.](#)



# Definiciones de términos de inmunización

## **Cobertura vacunal**

Porcentaje de lactantes (niños menores de un año) que recibieron determinadas dosis de vacunas. Por ejemplo, la cobertura de DTP3 es el porcentaje de lactantes que recibieron las tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP o el equivalente según el esquema de vacunación del país).

Sin vacunar – Lactante que no ha recibido la primera dosis de una serie de vacunas. El término «dosis cero» se utiliza para describir a los niños no vacunados con DTP1.

## **Sub-vacunado**

Lactante que ha recibido algunas pero no todas las dosis de vacunas recomendadas en el esquema de vacunación regular o calendario nacional.

## **Dosis de vacuna**

- Bacilo de Calmette-Guerin (BCG): vacuna contra la tuberculosis
- Dosis de nacimiento contra la hepatitis B, administrada en las 24 horas siguientes al nacimiento (HepBB)
- Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, primera dosis (DTP1) y tercera dosis (DTP3)
- Vacuna contra la hepatitis B, tercera dosis (HepB3)
- Vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b, tercera dosis (Hib3)
- Vacuna antipoliomielítica inactivada, primera dosis (IPV1) y última dosis (IPVC)
- Vacuna que contiene sarampión, primera dosis (MCV1) y segunda dosis (MCV2)
- Vacuna contra el rotavirus, última dosis (RotaC)
- Vacuna antineumocócica, última dosis (PCVC)
- Vacuna contra la fiebre amarilla (YFV)
- Vacuna meningocócica A (MengA)
- Vacuna contra el virus del papiloma humano, primera dosis (HPV1) y última dosis (HPVc): vacuna para proteger contra ciertos tipos de virus del papiloma humano que pueden provocar cáncer o verrugas genitales.

## **La Agenda de Inmunización 2030 (IA2030)**

La IA2030 es una estrategia mundial respaldada por la Asamblea Mundial de la Salud cuyo objetivo es garantizar que todas las personas, en todas partes y a todas las edades, se beneficien de las vacunas para mejorar su salud y bienestar de aquí a 2030. Se centra en el aumento de la cobertura vacunal, la equidad, la sostenibilidad y la preparación ante pandemias, al tiempo que promueve la inmunización a lo largo de toda la vida e articular la inmunización con otros servicios sanitarios.

# Conceptos clave

- La Organización Mundial de la Salud (OMS) proporciona recomendaciones mundiales sobre vacunas, que los países adaptan en función de sus necesidades locales. Se utilizan vacunas que contienen DTP, polio y sarampión en todos los países.
- La DTP1 es un indicador del acceso a los servicios de inmunización sistemática y, cuando no se administra, sirve como indicador sustitutivo para identificar a los niños que no han recibido ninguna vacuna, también conocidos como niños «sin dosis». Una cobertura elevada de la DTP1 indica un buen acceso a los servicios de inmunización, mientras que una cobertura baja sugiere dificultades para llegar a los niños con vacunas esenciales.
- La DTP3 es un indicador ampliamente utilizado para medir el rendimiento de los programas de inmunización. Refleja la capacidad de un país para prestar servicios de inmunización sistemática y garantiza que los niños estén protegidos contra enfermedades prevenibles. La cobertura de DTP3 se supervisa a nivel mundial y sirve como medida clave de los esfuerzos de vacunación de un país.
- El porcentaje de deserción o de abandono de la DTP1-DTP3 miden el porcentaje de niños que recibieron la DTP1 pero no la DTP3, representa a los niños con vacunación incompleta, indicando brechas en la prestación de los servicios y en el seguimiento.
- La MCV1 (que se recomienda normalmente entre los 9 y los 12 meses) evalúa la capacidad de administrar vacunas en una etapa más tardía de la infancia. Sirve como indicador trazador de la protección contra el sarampión y es un buen indicador de desempeño del sistema de salud / sanitario.
- La vacuna contra el VPH protege contra tipos específicos del virus del papiloma humano (VPH) y se utiliza para medir el ciclo de vida de la vacunación.
- Otros indicadores clave son el PCVC y el MCV2, que se utilizan para supervisar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- En conjunto, estos indicadores proporcionan una forma coherente y comparable de realizar un seguimiento de los progresos en materia de inmunización, identificar las comunidades que no han sido atendidas y monitorear los objetivos mundiales, establecidos en el marco de la Agenda de Inmunización 2030 (IA2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

# Mensajes clave

- La cobertura de la DTP1 se mantuvo constante en el 80 % entre 2024 y 2025.
- La cobertura de la DTP3 se mantuvo constante en el 75 % entre 2024 y 2025.
- En 2025 había aproximadamente el mismo número de niños sin ninguna dosis. Esto deja a 101 000 niños sin vacunar, vulnerables a enfermedades prevenibles mediante vacunación, y a otros 25 000 con una protección incompleta.
- Argentina representaba el 10,4 % de los niños sin ninguna dosis en América Latina y el Caribe (LACR) y el 0,7 % de los niños sin ninguna dosis a nivel mundial.
- La cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV1) se mantuvo constante en el 82 % entre 2024 y 2025. Hubo 91 000 niños que no recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión.
- La cobertura de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV2) se mantuvo constante en el 46 % entre 2024 y 2025.
- La cobertura de la última dosis de la vacuna contra el VPH (HPVc) entre las niñas aumentó del 55 % al 61 % en 2025 gracias a la mejora en el rendimiento del programa.

# Años de introducción de la vacuna

| Vaccine                                                 | National introduction | Risk groups | Risk areas |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|
| HPV (Human papillomavirus) vaccine                      | 2011                  |             |            |
| HepB birth dose                                         | 2000                  |             |            |
| Hepatitis B vaccine                                     | 2000                  |             |            |
| Hib (Haemophilus influenzae type B) vaccine             | 1997                  |             |            |
| IPV (Inactivated polio vaccine)                         | 2016                  |             |            |
| IPV (Inactivated polio vaccine) 2nd dose                | 2018                  |             |            |
| Malaria vaccine                                         | Not introduced        |             |            |
| Measles-containing vaccine 2nd dose                     | 1998                  |             |            |
| Meningococcal meningitis vaccines (any strain)          | 2017                  | 2007        |            |
| Mumps vaccine                                           | 1997                  |             |            |
| PCV (Pneumococcal conjugate vaccine)                    | 2012                  | 2007        |            |
| RSV (Respiratory syncytial virus) immunization strategy | 2024                  |             |            |
| Rotavirus vaccine                                       | 2015                  |             |            |
| Rubella vaccine                                         | 1998                  |             |            |
| Typhoid conjugate vaccine                               | Not introduced        |             |            |

Esta tabla muestra el año en que se introdujo cada vacuna en Argentina. Si se ha suspendido una vacuna, no se muestra el año de introducción, pero si se suspendió y posteriormente se reintrodujo, se indica el año de reintroducción. Los años de introducción pueden reflejar la implantación a nivel nacional, la implantación parcial (subnacional) o la introducción dirigida a grupos de riesgo específicos o zonas de alto riesgo, tal y como se indica en los encabezados de las columnas.

# Agotamiento de las existencias de vacunas

| Vaccines / supplies | 2021                             |
|---------------------|----------------------------------|
| PCV                 | National (6m)<br>and subnational |

Esta tabla presenta los desabastecimientos de vacunas infantiles relevantes para la WUENIC a nivel nacional y subnacional durante los últimos cinco años. Cuando se dispone de ella, se indica en meses la duración de los desabastecimientos a nivel nacional. Solo se muestran las vacunas que han sufrido desabastecimiento durante el período especificado.

Un desabastecimiento se refiere a un período en el que los puntos de almacenamiento y distribución de vacunas (por ejemplo, almacenes nacionales o distritales) se agotan por completo, incluidas las reservas de seguridad, y no pueden suministrar vacunas a los almacenes o centros de nivel inferior. Es importante señalar que los desabastecimientos a nivel de los centros pueden seguir produciéndose incluso cuando los almacenes de nivel superior tienen existencias. Los desabastecimientos, especialmente los prolongados, pueden afectar negativamente a la cobertura de inmunización.

En 2025, la cobertura aumentó para un antígeno, se mantuvo sin cambios para 14 y no disminuyó para ninguno, lo que indica un progreso general en los resultados de la vacunación sistemática; ninguno alcanzó una cobertura de al menos el 90 %.

Este mapa de calor muestra las tendencias en la cobertura de la vacuna desde 2000, con las celdas verdes indicando una cobertura del 90 % o más.

En 2025, ninguna de las 15 vacunas del calendario alcanzó una cobertura del 90 % o superior. La cobertura vacunal osciló entre el 7 % y el 82 %.

Desde 2002, se han realizado estimaciones para ocho nuevas vacunas. La IPVC es la vacuna más reciente de la que se tiene constancia (2021), y alcanzó una cobertura del 74 % en 2025.

En 2025, Argentina no notificó ningún caso de desabastecimiento de vacunas o suministros.

Cobertura vacunal, Argentina, 2000-2025


|       | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BCG   | 95   | 92   | 95   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99*  | 99   | 99   | 99   | 96   | 92   | 97   | 93   | 85   | 75   | 80   | 81   | 69   | 81   | 81   |
| HepBB |      |      |      |      | 65   | 71   | 72   | 76   | 79   | 81   | 79   | 85   | 88*  | 85   | 87*  | 84   | 81   | 82   | 82   | 77   | 72*  | 77   | 79   | 64   | 77   | 77   |
| DTP1  | 96   | 96   | 96   | 96   | 99   | 99   | 93   | 94   | 97   | 94   | 95   | 94   | 94*  | 94   | 98*  | 94   | 93   | 94   | 91   | 87   | 79   | 88   | 90   | 77   | 80   | 80   |
| DTP3  | 83   | 83   | 93   | 96   | 98   | 98   | 91   | 91   | 93   | 94   | 94   | 91   | 91*  | 94   | 94*  | 94   | 92   | 88   | 86   | 83   | 74   | 81   | 84   | 66   | 75   | 75   |
| Hib3  | 83   | 83   | 93   | 96   | 98   | 98   | 91   | 91   | 93   | 94   | 94   | 91   | 91*  | 94   | 94*  | 94   | 92   | 86   | 86   | 83   | 74   | 81   | 84   | 66   | 75   | 75   |
| HepB3 |      |      | 66   | 90   | 94   | 88   | 84   | 85   | 90   | 94   | 94   | 91   | 91*  | 94   | 94*  | 94   | 92   | 86   | 86   | 83   | 74*  | 81   | 84   | 66   | 75   | 75   |
| PCVC  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 41   | 86   | 89   | 82   | 82   | 78   | 88   | 80   | 75   | 79   | 79   | 71   | 79   | 79   |
| RotaC |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 61   | 75   | 88   | 80   | 77*  | 72   | 78   | 80   | 68   | 73   | 73   |
| IPV1  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 56   | 91   | 90   | 85   | 80   | 86   | 90   | 78   | 81   | 81   |
| IPVC  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 79   | 84   | 71   | 74   | 74   |
| MCV1  | 91   | 89   | 95   | 97   | 99   | 98   | 97   | 94   | 96   | 96   | 95   | 95   | 94*  | 94   | 95   | 89   | 90   | 90   | 94   | 86   | 77*  | 86   | 85   | 80   | 82   | 82   |
| RCV1  | 91   | 89   | 95   | 97   | 99   | 98   | 97   | 94   | 96   | 96   | 95   | 95   | 94   | 94   | 95   | 89   | 90   | 90   | 94   | 86   | 77   | 86   | 85   | 80   | 82   | 82   |
| MCV2  | 56   | 56   | 83   | 80   | 93   | 88   | 91   | 84   | 88   | 96   | 94   | 91   | 89*  | 83   | 96   | 87   | 88   | 91   | 99   | 84   | 71*  | 79   | 94   | 54   | 46   | 46   |
| YFV   |      |      |      |      |      |      |      | 8    | 14   | 12   | 8    | 7    | 7    | 5    | 6    | 6    | 6    | 7    | 8    | 8    | 6    | 8    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| HPVc  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 36   | 43   | 60   | 57   | 52   | 58   | 52   | 59   | 60   | 46   | 55   | 54   | 36   | 55   | 61   |



Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión.  
Nota: Información sobre existencias disponible desde 2003.  
Un asterisco (\*) indica dónde se produjo un desabastecimiento de vacunas a nivel nacional o subnacional.



Cobertura de vacunas infantiles clave (%), Argentina, 2000-2025



Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión

Este gráfico muestra las tendencias de cobertura de las vacunas contra la DTP y el sarampión. Se trata de antígenos clave para evaluar los programas nacionales de inmunización.

En 2025, la cobertura de la vacuna DTP1 (un indicador del acceso a los servicios de vacunación) fue del 82 %.


La cobertura de la vacuna DTP3 —un indicador del grado de eficacia con el que los países prestan servicios de vacunación a los niños— se situó por debajo del objetivo del 90 % fijado para 2030.

La OMS recomienda que los países alcancen una cobertura de al menos el 95 % con la primera (MCV1) y la segunda (MCV2) dosis de la vacuna contra el sarampión. La MCV1 proporciona protección inicial y la MCV2 garantiza la inmunidad a largo plazo y cubre las deficiencias en la cobertura.

En 2025, la cobertura de la MCV1 se situó por debajo del objetivo del 95 % y la cobertura de la MCV2 también se situó por debajo del objetivo del 95 %.

Entre 2024 y 2025, 0 vacunas aumentaron su cobertura, 0 la redujeron y 4 se mantuvieron igual.


Cobertura de vacunación en comparación con otros países de la región, LACR, 2025



Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión  
Nota: Se muestran los códigos ISO de los países. La cobertura en arg se muestra en los encabezados. La cobertura promedio regional se muestra con la línea discontinua.

DTP1

En 2025, la cobertura de la DTP1 fue del 80 % y la de la DTP3, del 75 %, lo que dejó a 126 000 niños sin vacunar o con una vacunación incompleta, incluidos 101 000 que no habían recibido ninguna dosis y 25 000 con protección solo parcial.



Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión  
Nota: Las líneas muestran la cobertura de la vacuna y las barras muestran el número de niños.  
Los niños sin dosis son aquellos que no recibieron la DTP1.

El objetivo principal de la Agenda de Inmunización 2030 es que, para 2030, todo el mundo tenga acceso a la vacunación, independientemente de dónde viva.



Este gráfico muestra las tendencias de cobertura de la primera dosis (DTP1) y la tercera dosis (DTP3) de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, el número de niños que no han recibido ninguna dosis y los casos de abandono de la vacuna DTP en Argentina.

En 2025, la cobertura de la vacuna DTP1 en Argentina se mantuvo constante en el 80 %. El número de niños que no recibieron ninguna dosis de la vacuna DTP (niños con cero dosis) se mantuvo constante, pasando de 101 000 en 2024 a 101 000 en 2025.

La cobertura de la DTP3 se mantuvo constante en el 75 % en 2025, lo que dejó a 126 000 niños vulnerables a enfermedades prevenibles mediante vacunación.



En 2025, la cobertura de la vacuna DTP1 en Argentina fue del 80 %, lo que supone 7 puntos porcentuales menos que en 2019 y está por debajo tanto de la media mundial como de la regional.



Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión  
Nota: Diferencia de cobertura en comparación con 2019 - los valores por encima de cero indican una cobertura superior a la de 2019 y los valores por debajo de cero indican una cobertura inferior a la de 2019.

En 2025, la cobertura de la DTP1 en Argentina (80 %) fue 10 puntos porcentuales inferior a la media mundial (90 %) y 9 puntos porcentuales inferior a la media de todos los países de la Iniciativa « LACR » (89 %).


La cobertura nacional de la DTP1 fue 7 puntos porcentuales inferior a la de 2019 (87 %).

Esto equivale a 101 000 niños sin ninguna dosis en 2025, frente a los 81 000 niños sin ninguna dosis en 2019.





En 2025, Argentina figuraba entre los países con mayor cobertura, pero se encontraba entre los tres primeros países de la región con mayor número de niños sin ninguna dosis, lo que contribuía de manera sustancial a la carga que supone el número de niños sin ninguna dosis.



Este gráfico muestra la cobertura de la vacuna DTP1 en los países de LACR, ordenados de menor a mayor cobertura, y la clasificación de los 10 países con mayor número de niños sin ninguna dosis, según cifras absolutas.


En 2025, Argentina ocupó el cuarto puesto de entre 33 países en cuanto a la cobertura más baja de la vacuna DTP1 (teniendo en cuenta los empates).

Argentina se situó entre los diez primeros países con mayor número de niños sin ninguna dosis (puesto n.º 3).

Nota: Los países con cohortes grandes pueden tener un número elevado de niños sin ninguna dosis a pesar de la alta cobertura vacunal. Es importante tener en cuenta tanto la cobertura como el número absoluto de niños sin vacunar para garantizar que no se pase por alto a los países vulnerables con cohortes de nacimiento pequeñas.

Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión  
Nota: Las barras se clasifican por cobertura ascendente. Los números en las burbujas muestran la clasificación superior 10 basada en el número absoluto de hijos dosis cero.

Países clasificados según el número de niños sin dosis, LACR, 2021-2025



Este gráfico compara la clasificación de los países en la región según el número absoluto de niños sin dosis, donde el puesto 1 representa al país con más niños sin dosis.


En 2021, Argentina ocupaba el séptimo puesto de entre 33 países, con 63 000 niños sin ninguna dosis.

En 2025, Argentina ocupaba el tercer puesto de entre 33 países, con 101 000 niños sin ninguna dosis.

Nota: Las cifras absolutas de niños que no han recibido ninguna dosis se basan en una combinación de los resultados del programa y el tamaño de la población infantil superviviente objetivo. Los países pueden ascender en la clasificación a pesar de que haya disminuido el número de niños que no han recibido ninguna dosis, ya que la clasificación también depende de los resultados de otros países de la región.

Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión  
Nota: El número entre paréntesis es el número de niños que no recibieron ninguna dosis.  
Los niños con dosis cero son aquellos que no recibieron la DTP1.

Cada año es necesario vacunar a más niños para alcanzar el objetivo de la IA2030 de reducir a la mitad el número de niños que no han recibido ninguna dosis para 2030, con un ligero aumento previsto en el número de bebés que sobreviven.




IA2030 insta a todos los países a reducir a la mitad el número de niños sin ninguna dosis en 2019 para 2030. Este gráfico muestra el número anual de niños que deben vacunarse para alcanzar el objetivo de ZD.

IA2030 insta a todos los países a reducir a la mitad, de aquí a 2030, el número de niños que en 2019 no recibieron ninguna dosis de vacuna. Este gráfico muestra el número anual de niños que deben vacunarse para alcanzar el objetivo relativo a los niños sin ninguna dosis.

Se prevé que Argentina registre un ligero aumento (<10 000) en el número de lactantes supervivientes para 2030. Por lo tanto, para alcanzar el objetivo de «ZD» de IA2030, es necesario vacunar cada año a un mayor número de niños (~3,27 %) con la vacuna DTP1.

Fuentes: OMS/UNICEF Estimaciones de la Cobertura Nacional de Inmunización, 2025 revisión; Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2024). World Population Prospects 2024, Online Edition. Nota: La Agenda de Inmunización 2030 (IA2030) pide a todos los países que reduzcan a la mitad para 2030 el número de niños con dosis cero en 2019.

En 2025, el número de niños que no habían recibido ninguna dosis superaba en un 67 % el objetivo anual de IA2030, lo que ponía en grave peligro el objetivo para 2030 si no se tomaban medidas urgentes.



IA2030 tiene como objetivo que nadie se quede atrás en materia de inmunización y exhorta a todos los países a reducir a la mitad el número de niños que no reciben ninguna dosis para 2030.

- Este gráfico muestra:
- Número estimado de niños sin ninguna dosis en 2000-2025 (barras azul oscuro)
  - Objetivo de cero dosis para 2030 (barra azul claro)
  - Trayectoria para alcanzar el objetivo de 2030 basada en una disminución lineal (puntos)


En 2025, el número de niños que no habían recibido ninguna dosis era aproximadamente un 67 % superior al número anual propuesto para alcanzar el objetivo, según una trayectoria lineal de descenso.

Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión

Nota: La Agenda de Inmunización 2030 (IA2030) insta a todos los países a reducir a la mitad el número de niños sin ninguna dosis en 2019 para 2030. Las barras azules oscuras representan el número estimado de niños sin ninguna dosis en 2000-2025, mientras que la barra azul claro representa el número objetivo de niños sin ninguna dosis para 2030.

La línea y los puntos muestran el progreso anual y la trayectoria para alcanzar el objetivo en 2030, basándose en una disminución lineal.

Para que aumente la cobertura vacunal, es necesario que el número de niños vacunados aumente o disminuya a un ritmo más lento que la disminución de la población infantil objetivo que sobrevive.



Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión

La cobertura de la vacuna DTP1 en 2025 (80 %) fue inferior a la de 2019 (87 %).

El número de niños vacunados con la DTP1 disminuyó un 25 % en comparación con 2019.

El número de lactantes supervivientes disminuyó aproximadamente un 19 % en comparación con 2019.

En 2025, se vacunaron 100 000 niños menos que en 2019.



En 2025, hubo 100 000 lactantes supervivientes (población objetivo) menos que en 2019.

Para que la cobertura vacunal aumente, es necesario que el número de niños vacunados aumente o disminuya a un ritmo más lento que la disminución de la población objetivo de lactantes supervivientes.

DTP3



En 2025, la cobertura de la vacuna DTP3 en Argentina fue del 75 %, lo que supone 8 puntos porcentuales menos que en 2019 y está por debajo de las medias tanto mundial como regional.




Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión  
Nota: Diferencia de cobertura en comparación con 2019 - los valores por encima de cero indican una cobertura superior a la de 2019 y los valores por debajo de cero indican una cobertura inferior a la de 2019.

En 2025, la cobertura de la DTP3 en Argentina (75 %) fue 10 puntos porcentuales inferior a la media mundial (85 %) y 8 puntos porcentuales inferior a la media de todos los países de la Iniciativa « LACR » (83 %).

La cobertura nacional de la DTP3 fue 8 puntos porcentuales inferior a la de 2019 (83 %).

Esto equivale a 126 000 niños sin vacunar o con vacunación incompleta en 2025, frente a los 105 000 niños sin vacunar o con vacunación incompleta en 2019.

En 2025, Argentina figuraba entre los países con mayor cobertura, pero también se encontraba entre los diez países de la región con mayor número de niños sin vacunar o con vacunación incompleta.



Este gráfico muestra la cobertura de la vacuna DTP3 en los países de LACR, ordenados de menor a mayor cobertura, y la clasificación de los 10 países con mayor número de niños sin vacunar o con vacunación incompleta, según cifras absolutas.


En 2025, Argentina ocupó el cuarto puesto de entre 33 países en cuanto a la cobertura más baja de la vacuna DTP3 (teniendo en cuenta los empates).

Argentina se situó entre los diez primeros países con mayor número de niños sin vacunar o con vacunación incompleta (puesto n.º 4).

Nota: Los países con cohortes grandes pueden tener un número elevado de niños sin vacunar o con vacunación incompleta a pesar de una alta cobertura vacunal. Es importante tener en cuenta tanto la cobertura como el número absoluto de niños sin vacunar para garantizar que no se pase por alto a los países vulnerables con cohortes de nacimiento pequeñas.

Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión  
Nota: Las barras se clasifican por cobertura ascendente. Los números en las burbujas muestran la clasificación superior 10 basada en el número absoluto de hijos sin vacunar y con vacunación incompleta.

Para que aumente la cobertura vacunal, es necesario que el número de niños vacunados aumente o disminuya a un ritmo más lento que la disminución de la población objetivo de lactantes supervivientes.



Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión  
Nota: No vacunados incluye a los niños con dosis cero e infravacunados.

La cobertura de la vacuna DTP3 en 2025 (75 %) fue inferior a la de 2019 (83 %).

El número de niños vacunados con la DTP3 disminuyó un 26 % en comparación con 2019.

El número de lactantes supervivientes disminuyó aproximadamente un 19 % en comparación con 2019.


En 2025, se vacunaron 100 000 niños menos que en 2019.

En 2025, hubo 100 000 lactantes supervivientes (población objetivo) menos que en 2019.

Para que la cobertura vacunal aumente, es necesario que el número de niños vacunados aumente o disminuya a un ritmo más lento que la disminución de la población objetivo de lactantes supervivientes.

MCV1

La cobertura de la vacuna MCV1 se mantuvo constante en el 82 % en 2025, por debajo del nivel del 95 % necesario para prevenir brotes, lo que dejó a 91 000 niños sin protección alguna contra el sarampión. La cobertura de la MCV2 también se mantuvo constante en el 46 %, por debajo del objetivo de IA2030 del 90 %.



Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión  
Nota: Las líneas muestran la cobertura vacunal y las barras el número de niños.



El sarampión, debido a su alta transmisibilidad, actúa como un «canario en la mina de carbón», poniendo rápidamente de manifiesto cualquier brecha en la inmunidad de la población. Por lo tanto, la cobertura de la vacuna contra el sarampión (MCV) se utiliza a menudo como indicador de la protección.

El porcentaje de niños que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV1) —normalmente a los 9 o 12 meses, según el calendario nacional de vacunación— se mantuvo constante en el 82 %. Esta cifra es inferior a la de 2019, cuando la cobertura fue del 86 %.

91 000 niños no recibieron su primera dosis rutinaria de la vacuna contra el sarampión.

La segunda dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV2) se administra normalmente a niños de entre 18 meses y cinco años. La cobertura de la MCV2 se mantuvo constante en el 46 % en 2025.

En 2025, la cobertura de la vacuna MCV1 en Argentina fue del 82 %, lo que supone 4 puntos porcentuales menos que en 2019 y está por debajo tanto de la media mundial como de la regional.



En 2025, la cobertura de la vacuna MCV1 en Argentina (82 %) fue 2 puntos porcentuales inferior a la media mundial (84 %) y 4 puntos porcentuales inferior a la media de todos los países de la red « LACR » (86 %).


La cobertura nacional de la MCV1 fue 4 puntos porcentuales inferior a la de 2019 (86 %).

Esto equivale a 91 000 niños sin vacunar en 2025, frente a los 87 000 niños sin vacunar de 2019.

Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión  
Nota: Diferencia de cobertura en comparación con 2019 - los valores por encima de cero indican una cobertura superior a la de 2019 y los valores por debajo de cero indican una cobertura inferior a la de 2019.



En 2025, Argentina figuraba entre los países con mayor cobertura, pero también se encontraba entre los diez países de la región con mayor número de niños sin vacunar.



Este gráfico muestra la cobertura de la MCV1 en los países de LACR, ordenados de menor a mayor cobertura, y la clasificación de los 10 países con más niños sin vacunar, según las cifras absolutas.


En 2025, Argentina ocupaba el séptimo puesto de entre 33 países en cuanto a la cobertura más baja de la vacuna MCV1 (teniendo en cuenta los empates).

Argentina se encontraba entre los diez países con más niños sin vacunar (puesto n.º 5).

Nota: Los países con cohortes grandes pueden tener un número elevado de niños sin vacunar a pesar de la alta cobertura vacunal. Es importante tener en cuenta tanto la cobertura como el número absoluto de niños sin vacunar para garantizar que no se pase por alto a los países vulnerables con cohortes de nacimiento pequeñas.

Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión  
Nota: Las barras se clasifican por cobertura ascendente. Los números en las burbujas muestran la clasificación superior 10 basada en el número absoluto de hijos sin vacunar.

Para que aumente la cobertura vacunal, es necesario que el número de niños vacunados aumente o disminuya a un ritmo más lento que la disminución de la población objetivo de lactantes supervivientes.



Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión

La cobertura de la vacuna MCV1 en 2025 (82 %) fue inferior a la de 2019 (86 %).

El número de niños vacunados con la primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (MCV1) disminuyó un 22 % en comparación con 2019.

El número de lactantes supervivientes disminuyó aproximadamente un 19 % en comparación con 2019.


En 2025, se vacunaron 100 000 niños menos que en 2019.

En 2025, hubo 100 000 lactantes supervivientes (población objetivo) menos que en 2019.

Para que la cobertura vacunal aumente, el número de niños vacunados debe aumentar o disminuir a un ritmo más lento que el descenso de la población objetivo de lactantes supervivientes.

En 2025, Argentina registró un aumento de los casos de sarampión en comparación con 2024, mientras que la cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV1) fue del 82 % y la de la segunda dosis (MCV2), del 46 %.

Tendencias en el número de casos de sarampión y cobertura de MCV, Argentina, 2015-2025



Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión; Casos de sarampión y rubéola notificados y tasas de incidencia por los Estados Miembros de la OMS, a 12 junio 2026. Datos provisionales basados en datos mensuales comunicados a la OMS (Ginebra) hasta 12 junio 2026. Los años con desabastecimiento de vacunas contra el sarampión y las cruces (^) indican años con campañas de vacunación contra el sarampión (nacionales o subnacionales).

En 2025, se registraron un total de 37 casos confirmados de sarampión en Argentina. Ese mismo año, la cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV1) fue del 82 % y la de la segunda dosis (MCV2), del 46 %.

El número de casos en 2025 fue 2,6 veces superior al de 2024 (n = 14).

El mayor número de casos de sarampión se registró en 2019 (n = 134). Ese año, la cobertura de la MCV1 fue del 86 %.


Argentina notificó desabastecimientos de vacunas contra el sarampión en 2012 y 2020.

En 2022 se llevaron a cabo actividades o campañas de inmunización complementarias con vacunas que contienen la vacuna contra el sarampión.

# Vacunación infantil: Tablas adicionales

En 2025, la tasa de abandono de la serie DTP1-DTP3 fue moderada (6 %) y la de la serie DTP1-MCV1 fue baja (-2 %) en Argentina, lo que indica una capacidad moderada para administrar la serie primaria en una fase temprana, pero una buena capacidad para completar el ciclo completo de vacunación durante la primera infancia.

Abandono de la vacunación, Argentina, 2000-2025



Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión  
Clasificación del abandono: <5 % = bajo, 5-10 % = medio, >10 % = alto

Las tasas de abandono muestran el porcentaje de niños que recibieron la DTP1, pero no la DTP3/MCV1. Las tasas de abandono bajas indican una alta retención de niños en los programas de inmunización.

Este gráfico muestra las tendencias en las tasas de abandono entre la DTP1 y la DTP3, y entre la DTP1 y la MCV1.


En 2025, el 6 % de los niños que recibieron la primera dosis de DTP no recibieron la tercera dosis de DTP (izquierda), y el -2 % de los niños que recibieron la primera dosis de DTP no recibieron la primera dosis de MCV (derecha).

La tasa media de abandono de la DTP indica una capacidad moderada para administrar una serie completa de vacunas en las primeras etapas de la vida. La baja tasa de abandono de la DTP-MCV indica una buena retención en los programas de inmunización y la capacidad de administrar un ciclo completo de vacunas durante la primera infancia (hasta un año).

En 2025, el abandono de la DTP en Argentina fue superior a la tasa mundial, mientras que el abandono de la DTP-MCV fue inferior a la tasa mundial.

En 2025, Argentina registró su cobertura más baja en la vacuna contra la fiebre amarilla (7 %), mientras que la mayoría de las demás vacunas sistemáticas se situaron entre el 46 % y el 82 %; la cobertura de 8 antígenos disminuyó con respecto a 2019, y la de otros 8 se mantuvo constante desde 2024.

Cobertura de las vacunas infantiles recomendadas, Argentina, 2000-2025



Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión  
Nota: Las etiquetas de datos se muestran para 2000 (o el primer año del informe), 2019 y 2025.


Este gráfico muestra las tendencias en la cobertura de determinadas vacunas rutinarias básicas recomendadas en la infancia.

En 2025, la vacuna contra la fiebre amarilla (YFV) presentaba la cobertura más baja (7 %), seguida de la vacuna contra la poliomielitis (MCV2) (46 %).

En comparación con 2019, la cobertura de ocho vacunas disminuyó (BCG, DTP1, DTP3, IPV1, MCV1, MCV2, ROTAC y YFV).

En comparación con 2024, la cobertura de ocho vacunas se mantuvo constante (BCG, DTP1, DTP3, IPV1, MCV1, MCV2, ROTAC y YFV).

Cobertura vacunal (%), Argentina, 2000-2025



Este gráfico muestra las tendencias en la cobertura de 10 vacunas (serie completa).


En 2025, la MCV2 presentaba la cobertura más baja de todas las vacunas (46 %), seguida de la HPVc (61 %).

La cobertura de ocho vacunas disminuyó (DTP3, HEPB3, HIB3, IPV1, MCV1, MCV2, ROTAC y RUBELLA) y la de una vacuna aumentó (HPVC) en comparación con la cobertura respectiva de 2019.

La cobertura de nueve vacunas se mantuvo igual (DTP3, HEPB3, HIB3, IPV1, IPVC, MCV1, MCV2, ROTAC y RUBELLA) y la de una vacuna aumentó (HPVC) en comparación con la cobertura respectiva de 2024.



## Cobertura vacunal (%), Argentina, 2019-2025



Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión  
 Nota: La barra gris abarca la cobertura de la vacuna en todos los años 2019-2025 y los puntos representan la cobertura en años específicos.  
 Se muestra la cobertura de las vacunas con datos de todos los años 2019-2025.  
 Los nombres de las vacunas se colorean según si la cobertura es inferior (rojo), igual (azul) o superior (verde) a la de 2019.

Este gráfico muestra el rango de cobertura en todos los años desde 2019 hasta 2025 (barras grises) y la cobertura en años específicos (puntos), por vacuna. El gráfico se puede utilizar para evaluar la recuperación hasta los niveles previos a la pandemia.

La cobertura de la DTP1 disminuyó entre 2019 (87 %) y 2024 (80 %). La cobertura de la DTP1 se mantuvo igual en 2025 (80 %) con respecto a 2024, y fue inferior a la de 2019. Entre 2019 y 2025, la cobertura de la DTP1 alcanzó su nivel más bajo en 2023 (77 %).

En 2024, 12 vacunas registraron una cobertura inferior a la de 2019.

En 2025, 12 vacunas registraron una cobertura inferior a la de 2019.


En 2025, ninguna vacuna registró una cobertura inferior a la de 2024.

# HPV vaccination

Métodos: • [Bruni et al. 2021, HPV vaccination introduction worldwide and WHO and UNICEF estimates of national HPV immunization coverage 2010–2019 \(supplementary materials\).](#)

En 2025, la cobertura de la última dosis de la vacuna contra el VPH entre las niñas aumentó hasta el 61 % y la cobertura entre los niños aumentó hasta el 57 %, tras el cambio a una dosis única en 2024.

Cobertura de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) (%), Argentina, 2011-2025




El primer año para el que se disponen estimaciones de la cobertura del programa contra el VPH en Argentina fue 2011.

En 2025, la cobertura del programa para la primera dosis (HPV1) entre las niñas fue del 61 %. En 2025, la cobertura del programa para la última dosis (HPVc) entre las niñas fue del 61 %.

SDG 3.b.1

En 2025, ninguna vacuna relacionada con los ODS alcanzó el objetivo de cobertura del 90 % fijado por los ODS.

ODS 3.b.1: Proporción de la población objetivo cubierta por todas las vacunas incluidas en su programa nacional, Argentina, 2000-2025



Fuente: OMS/UNICEF Estimaciones de la cobertura nacional de inmunización, 2025 revisión  
Nota: Los cuatro indicadores de cobertura de vacunación que contribuyen al indicador 3.b.1 de los ODS son: DTP3, MCV2, PCVC y HPVc.  
El objetivo mundial de la Agenda de Inmunización 2030 (IA2030) es alcanzar una cobertura del 90 % para los cuatro antígenos en 2030.

Cuatro indicadores de cobertura vacunal contribuyen al Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, indicador b.1: DTP3, PCV3, MCV2 y VPH.


La meta mundial de IA2030 es alcanzar una cobertura del 90 % para los cuatro antígenos para 2030.

Argentina cuenta con las cuatro vacunas de los ODS.

En 2025, Argentina había alcanzado una cobertura de al menos el 90 % en ninguna de las cuatro vacunas.

Recursos adicionales

## WUENIC country profiles (PDF and interactive versions)




## Datasets: WUENIC, HPV, survey database

|    | A                 | B       | C               | D    | E          | F        | G          | H            | I         | J |
|----|-------------------|---------|-----------------|------|------------|----------|------------|--------------|-----------|---|
|    | unicef_regioiso3c | country | vaccine         | year | target_grp | coverage | vaccinated | unvaccinated | target    |   |
| 1  | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 1982 | births     | 10       | 57,000     | 514,000      | 571,000   |   |
| 2  | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 1983 | births     | 10       | 56,000     | 503,000      | 559,000   |   |
| 3  | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 1984 | births     | 11       | 62,000     | 501,000      | 563,000   |   |
| 4  | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 1985 | births     | 17       | 100,000    | 490,000      | 591,000   |   |
| 5  | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 1986 | births     | 18       | 107,000    | 489,000      | 596,000   |   |
| 6  | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 1987 | births     | 27       | 161,000    | 434,000      | 595,000   |   |
| 7  | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 1988 | births     | 40       | 238,000    | 358,000      | 596,000   |   |
| 8  | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 1989 | births     | 38       | 233,000    | 380,000      | 614,000   |   |
| 9  | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 1990 | births     | 30       | 191,000    | 446,000      | 637,000   |   |
| 10 | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 1991 | births     | 21       | 134,000    | 505,000      | 640,000   |   |
| 11 | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 1992 | births     | 19       | 127,000    | 541,000      | 668,000   |   |
| 12 | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 1993 | births     | 17       |            |              | 760,000   |   |
| 13 | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 1994 | births     | 15       |            |              | 852,000   |   |
| 14 | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 1995 | births     |          |            |              | 899,000   |   |
| 15 | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 1996 | births     |          |            |              | 932,000   |   |
| 16 | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 1997 | births     |          |            |              | 962,000   |   |
| 17 | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 1998 | births     |          |            |              | 986,000   |   |
| 18 | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 1999 | births     |          |            |              | 1,013,000 |   |
| 19 | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 2000 | births     | 30       |            |              | 1,037,000 |   |
| 20 | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 2001 | births     | 43       | 453,000    | 374,000      | 1,007,000 |   |
| 21 | ROSA              | AFG     | Afghanistan bcg | 2002 | births     | 46       | 467,000    | 548,000      | 1,015,000 |   |

## Country and region-specific slides:

UNICEF, WHO, World Bank, Gavi and  
African Union regions




## Interactive immunization regional snapshots:

UNICEF, WHO, World Bank, Gavi and  
African Union regions




## Country data quality reports (NEW 2026)



## Country and region-specific high-level talking points

(NEW 2026)



## Recursos adicionales

Se pueden  
consultar más  
fuentes de  
información  
sobre  
vacunación en:  
<https://data.unicef.org/resources/immunization/>

Los perfiles  
interactivos de  
los países de la  
WUENIC se  
pueden  
consultar en:

<https://worldhealthorg.shinyapps.io/wuenic-trends/>



# Cuestionario breve de retroalimentación

(5 minutos)

Nos gustaría conocer su opinión sobre las agrupaciones mundiales (GAVI, Unión Africana, Banco Mundial, OMS y UNICEF) y las diapositivas de PowerPoint a nivel nacional elaboradas para la publicación de las estimaciones mundiales sobre inmunización. Sus comentarios nos ayudarán a comprender su utilidad y a identificar aspectos que pueden mejorarse.

Le rogamos que dedique unos minutos a completar esta breve encuesta y nos haga llegar su opinión:

<https://forms.office.com/e/Qv1HXxxNZQ>

