


Points clés de WUENIC : Région Western Africa

Année de révision : 2025

Sommaire

Présentation générale	2
DTC1 : Atteindre les enfants zéro dose	4
DTC3 : Un marqueur de la prestation des services de vaccination de routine aux enfants	6
VAR : Le canari dans la mine de charbon	8
HPV	10
Pays prioritaires bénéficiant d'un soutien pour se remettre de la pandémie de COVID-19	11
Annexe	13

Pays de la région Western Africa



- La région Western Africa comprend les 15 pays suivants : Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Cote d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, and Togo.

Présentation générale

- Tout en notant des variations d'un pays à l'autre et d'un vaccin à l'autre, aucun des 15 vaccins infantiles ont atteint une couverture moyenne de 90 % ou plus dans la région Western Africa en 2025.
- Taux de couverture de la première dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTP1) a reculé, passant de 81 % en 2024 à 80 % en 2025, et taux de couverture de la troisième dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTP3) était identique en 2025 à celui de 2024 (73 %). Couverture vaccinale pour la première dose du vaccin contre la rougeole (MCV1) a reculé, passant de 67 % en 2024 à 66 % en 2025.
- Au total, 12 pays sur 15 ont atteint l'objectif de couverture (90 %) pour l'ensemble des 15 antigènes, ce qui représente 80 % de la région.
- 3 pays n'ont pas atteint l'objectif de couverture pour l'ensemble des antigènes : Gambia, Guinea, and Nigeria.
- En 2025, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose (2.8 million) s'élevait à environ 45 % supérieur à du nombre annuel proposé pour atteindre l'objectif du Programme de vaccination 2030 visant à réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose d'ici 2030 dans la région Western Africa (1.9 million), sur la base d'une trajectoire de baisse linéaire.


Taux de couverture vaccinale (%), région d'Western Africa, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	61	59	57	59	62	66	68	70	77	84	75	70	70	66	68	70	77	79	80	81	81	75	78	80	80	79
HepBB	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	5	6	6	7	10	11	12	13	17	21	21	24	23	23
DTP1	58	58	59	61	62	65	66	69	74	81	74	70	69	67	67	68	75	77	79	80	78	72	76	80	81	80
DTP3	42	42	42	46	49	53	56	59	65	71	67	62	60	60	60	60	67	69	71	74	70	65	68	72	73	73
Hib3	1	1	6	6	6	8	17	21	24	37	38	36	43	51	60	60	67	69	71	74	70	65	68	72	73	73
HepB3	1	1	10	17	23	31	41	52	59	71	64	60	60	60	60	60	67	69	71	74	70	65	68	72	73	73
PCVC									0	0	1	6	10	14	23	51	62	66	68	70	67	59	66	69	70	69
RotaC							0	0	0	0	0	0	3	6	16	23	28	33	34	34	36	36	45	60	64	61
IPV1																30	45	41	60	73	70	65	68	76	75	77
IPVC																						9	31	46	54	60
MCV1	45	45	44	48	51	55	57	56	62	70	65	61	59	58	58	58	62	65	66	67	66	61	62	64	67	66
RCV1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	12	14	15	21	23	23	23	23	23	26	32
MCV2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	7	12	14	16	16	23	28	33	37	43	47	49
YFV	15	17	21	25	39	51	54	59	58	69	61	53	48	57	55	56	57	61	65	66	64	60	61	63	65	64
MengA																	1	14	21	35	52	49	53	54	59	57
HPVc											0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	28	47	60



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Nombre estimé d'enfants n'ayant reçu aucune dose, 2000–2025 et objectif d'ici 2030, Western Africa Région



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.
 Remarque : Le Programme de vaccination 2030 (IA2030) appelle tous les pays à réduire de moitié d'ici 2030 le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose en 2019.
 t le nombre estimé d'enfants n'ayant reçu aucune dose entre 2000 et 2025, tandis que la barre bleu clair correspond au nombre cible d'enfants n'ayant reçu aucune dose d'ici 2030.
 La courbe et les points illustrent les progrès annuels et la trajectoire permettant d'atteindre l'objectif d'ici 2030, sur la base d'une baisse linéaire.


DTC1 : Atteindre les enfants zéro dose

- Le nombre d'enfants vaccinés avec le DTP1 a augmenté 6.4 % entre 10.7 million en 2019 et 11.3 million en 2025.
- La couverture du DTP1 en 2025 était de 80 %, soit le même niveau qu'en 2019, mais inférieure à celle de 2024 (81 %).
- En 2025, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose (2.8 million) représentait environ 45 % supérieur à du nombre annuel proposé pour atteindre l'objectif de l'Agenda de vaccination 2030 dans la région d' Western Africa e (1.9 million), sur la base d'une trajectoire de baisse linéaire.
- En 2025, Nigeria and Cote d'Ivoire représentait respectivement environ 77 % et 6 % de l'ensemble des enfants n'ayant reçu aucune dose dans Western Africa (n = 2.8 million). Nigeria comptait le plus grand nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose, soit 2.2 million, et Cote d'Ivoire occupait la deuxième place avec 156,000.
- En 2025, c'est dans Nigeria que la couverture du DTP1 a été la plus faible, avec 70 %, suivi de Guinea avec 78 %.
- Il y en avait 10 (67 %) des 15 pays de la région ont atteint une couverture de 90 % ou plus pour le DTP1 en 2025.

**Couverture du DTP1 (en %), par pays,
Western Africa Région, 2000–2025**


	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ghana	88	81	84	87	88	88	87	96	96	96	96	94	92	94	99	97	94	99	97	97	94	99	99	99	99	99
Burkina Faso	85	87	89	90	90	91	91	92	93	93	93	93	94	94	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Niger	46	48	51	53	56	58	64	69	76	81	83	86	87	89	95	93	92	95	91	92	93	94	96	94	95	95
Togo	80	63	75	83	83	91	91	94	92	93	97	94	94	94	89	88	89	89	90	93	92	94	95	95	95	95
Senegal	79	79	70	81	95	97	99	97	94	94	96	97	96	96	94	94	96	97	96	93	89	91	93	92	96	94
Cabo Verde	94	94	95	95	96	97	98	99	99	99	99	99	98	93	99	97	96	97	99	96	93	93	93	93	93	93
Sierra Leone	64	58	89	90	82	80	79	77	84	94	95	97	98	98	88	95	97	98	97	95	93	94	92	92	92	92
Liberia	80	76	73	69	65	75	75	80	85	90	80	86	91	91	74	77	83	89	91	86	82	81	93	91	91	91
Guinea-Bissau	73	75	77	79	81	83	86	89	91	94	93	92	94	93	92	91	90	91	95	91	94	91	93	95	89	90
Mali	61	78	87	91	94	96	91	89	85	82	81	80	75	69	73	78	82	82	82	82	75	81	84	85	91	90
Cote d'Ivoire	85	81	76	71	73	83	95	93	89	95	87	74	93	83	92	96	98	93	96	94	87	85	83	82	81	84
Gambia	97	97	96	97	96	95	98	98	96	98	99	99	99	99	98	99	99	93	94	93	88	82	85	84	82	84
Benin	89	88	87	86	85	84	89	94	91	89	87	85	89	86	86	82	84	83	82	81	80	80	79	79	81	82
Western Africa	58	58	59	61	62	65	66	69	74	81	74	70	69	67	67	68	75	77	79	80	78	72	76	80	81	80
Guinea	61	64	68	71	75	75	75	76	64	76	86	76	70	64	58	64	62	64	65	67	68	70	71	73	77	78
Nigeria	44	43	43	45	46	48	49	52	63	73	60	56	51	49	48	49	62	65	69	72	70	57	63	71	71	70

Taux de couverture vaccinale (%)




Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.
Remarque : les pays sont classés par ordre décroissant de couverture DTP1 pour l'année 2025.

Couverture du DTP1 (en %), par pays, région Western Africa, année 2025



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.
Remarque : cette carte est schématisée et établie à une échelle approximative.
Cette carte ne reflète pas la position de l'UNICEF ou de l'OMS quant au statut juridique d'un pays ou d'un territoire, ni quant au tracé des frontières.

Couverture du programme DTP1 et enfants n'ayant reçu aucune dose au fil du temps, Western Africa, 2000-2025



La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

DTC3 : Un marqueur de la prestation des services de vaccination de routine aux enfants

- Nombre d'enfants vaccinés avec le DTP3 a augmenté 5.2 % entre 9.8 million en 2019 et 10.3 million en 2025. En raison d'une croissance démographique d'environ 7 % entre 2019 et 2025, le taux de couverture du DTP3 en 2025 (73 %) était inférieur à celui de 2019 (74 %).
- La couverture du DTP3 en 2025 s'élevait à 73 %, soit un taux inférieur à celui de 2019 (74 %) et identique à celui de 2024.
- En 2025, 9 % des enfants ayant reçu le DTP1 n'ont pas reçu le DTP3, soit en hausse de 1 point de pourcentage par rapport à 2019 (8 %) ; ces taux d'abandon moyens indiquent une capacité modérée à assurer une série complète de vaccins dès le plus jeune âge.
- En 2025, le taux de couverture du DTP3 variait de 62 % dans Nigeria à 99 % dans Ghana.
- En 2025, Nigeria affichait un taux de couverture vaccinale DTP3 de 62 % et comptait le plus grand nombre absolu d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés de la région (2.8 million), suivi par Cote d'Ivoire avec une couverture de 70 % et 293,000 enfants non vaccinés ou sous-vaccinés.


Couverture du DTP3 (en %), par pays,
Western Africa Région, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ghana	88	79	78	80	80	84	84	94	93	94	94	91	92	90	98	89	93	99	97	97	94	98	99	95	95	99
Cabo Verde	90	90	91	92	93	95	96	98	99	99	99	90	94	93	95	93	96	96	98	96	93	93	93	93	93	93
Burkina Faso	45	62	69	79	79	82	86	89	93	92	91	91	90	88	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Senegal	52	52	60	73	87	84	89	94	88	86	89	92	91	92	89	89	93	93	92	91	83	85	93	92	91	91
Sierra Leone	44	38	53	73	65	65	64	64	77	84	86	89	91	92	83	86	84	90	93	95	91	92	91	91	91	91
Togo	64	50	59	72	71	82	84	82	81	78	83	85	84	84	84	82	82	84	84	88	87	90	90	90	90	90
Niger	34	36	39	41	43	45	52	58	67	71	70	75	73	75	82	84	80	85	79	81	81	82	84	85	86	87
Guinea-Bissau	49	53	57	60	64	68	71	74	77	80	83	86	87	87	86	86	85	79	85	84	82	78	88	91	85	84
Mali	43	49	61	63	69	77	78	74	74	73	73	66	65	64	66	70	76	77	76	76	70	75	76	76	83	84
Liberia	48	44	39	35	31	60	60	65	75	81	70	77	80	80	63	65	73	80	81	71	66	67	79	83	83	83
Gambia	80	87	87	87	87	95	95	95	96	98	97	96	98	97	96	97	95	92	93	88	85	82	79	84	80	82
Western Africa	42	42	42	46	49	53	56	59	65	71	67	62	60	60	60	60	67	69	71	74	70	65	68	72	73	73
Cote d'Ivoire	65	66	65	62	68	77	77	76	74	81	78	61	82	75	73	79	87	83	84	79	73	71	69	72	68	70
Benin	78	76	75	73	72	70	74	82	75	79	76	75	80	77	74	74	78	76	74	72	70	70	69	69	69	69
Guinea	46	50	53	57	60	59	57	63	60	57	64	63	57	50	44	48	47	49	51	53	54	56	58	60	63	65
Nigeria	29	27	25	29	33	36	40	42	53	63	56	49	42	43	43	42	53	55	61	66	62	50	55	63	63	62




Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.
Remarque : les pays sont classés par ordre décroissant de couverture DTP3 pour l'année 2025.

Couverture du DTP3 (en %), par pays, région Western Africa, année 2025



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.
Remarque : cette carte est schématisée et établie à une échelle approximative.
Cette carte ne reflète pas la position de l'UNICEF ou de l'OMS quant au statut juridique d'un pays ou d'un territoire, ni quant au tracé des frontières.

Couverture vaccinale contre la DTP3 et enfants non vaccinés ou sous-vaccinés au fil du temps, Western Africa, 2000-2025



La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

VAR : Le canari dans la mine de charbon

- La couverture du MCV1 en 2025 s'élevait à 66 %, soit le même pourcentage qu'en 2019 et en 2024.
- Le taux de couverture de la deuxième dose du vaccin contre la rougeole (MCV2) en 2025 s'élevait à 49 %, soit un taux supérieur à celui observé en 2019 (23 %) et 2024 (47 %). Cela signifie que 4.8 million enfants ne bénéficient toujours d'aucune protection et que 2 million autres ne disposent que d'une protection partielle contre le virus de la rougeole.
- En 2025, 18 % des enfants ayant reçu le DTP1 n'ont pas reçu le MCV1. Ce taux d'abandon de 18 % était supérieur de 2 points de pourcentage à celui de 2019 (16 %) et supérieur au taux d'abandon de 2024 (17 %).
- Les taux élevés d'abandon des programmes DTP-MCV témoignent d'une faible fidélisation aux programmes de vaccination.
- 5 pays (Benin, Cote d'Ivoire, Guinea, Mali, and Nigeria) ont affiché un taux de couverture par le vaccin MCV1 inférieur à 80 % pendant chacune des 3 dernières années.
- En 2025, le Nigeria comptait le plus grand nombre d'enfants n'ayant pas reçu le vaccin contre la rougeole (3.2 million), ce qui représentait environ 66 % de l'ensemble des enfants non protégés contre la rougeole dans la Western Africa (4.8 million).


**Couverture du MCV1 (en %), par pays,
Western Africa Région, 2000–2025**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cabo Verde	86	88	89	90	91	93	94	96	97	97	97	96	91	91	93	92	93	96	99	98	95	95	95	95	95	95
Ghana	90	78	78	80	83	83	85	95	86	93	93	91	89	89	92	89	89	95	92	92	88	94	95	88	95	93
Senegal	48	48	54	60	57	74	80	84	77	79	81	84	83	84	80	80	93	90	86	86	82	88	87	87	87	92
Sierra Leone	37	50	62	73	76	71	65	60	73	80	82	84	86	85	80	78	85	80	87	93	87	87	90	90	90	90
Burkina Faso	48	63	64	76	78	84	88	94	94	94	92	89	87	82	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Liberia	63	58	52	47	41	62	63	71	76	83	65	71	80	74	58	64	70	75	74	68	61	58	79	82	82	82
Niger	37	39	41	43	45	47	53	60	66	69	67	69	75	80	80	85	76	82	77	79	79	80	65	80	81	82
Togo	58	40	48	68	70	70	78	71	63	66	68	72	72	72	77	75	73	79	75	81	76	80	82	79	81	81
Gambia	89	89	90	90	92	91	89	88	92	96	92	91	95	96	96	97	97	90	91	85	82	79	74	80	83	78
Guinea-Bissau	71	72	73	74	75	76	74	73	71	69	76	83	81	81	81	80	80	66	81	83	78	70	84	83	76	69
Mali	49	54	56	57	63	73	68	66	71	73	78	72	67	62	61	65	70	70	70	71	62	71	69	68	72	68
Western Africa	45	45	44	48	51	55	57	56	62	70	65	61	59	58	58	58	62	65	66	67	66	61	62	64	67	66
Guinea	42	44	46	48	50	51	51	57	55	53	58	62	58	54	50	47	48	48	49	50	50	51	51	52	60	62
Cote d'Ivoire	68	71	71	70	78	84	73	67	63	67	64	49	74	70	59	67	73	70	73	72	63	62	56	63	65	58
Nigeria	33	32	30	34	37	41	44	41	53	64	56	49	42	43	44	42	48	54	56	58	60	48	51	54	57	56
Benin	70	68	66	65	63	61	66	70	66	71	68	70	74	68	65	67	68	65	61	58	54	53	52	52	51	49

Taux de couverture vaccinale (%)  0 60 70 80 90 100


Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.
Remarque : les pays sont classés par ordre décroissant de couverture MCV1 pour l'année 2025.

Couverture du MCV1 (en %), par pays, région Western Africa, année 2025



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.
Remarque : cette carte est schématisée et établie à une échelle approximative.
Cette carte ne reflète pas la position de l'UNICEF ou de l'OMS quant au statut juridique d'un pays ou d'un territoire, ni quant au tracé des frontières.

Couverture par le MCV et enfants n'ayant reçu aucune dose de MCV au fil du temps, Western Africa, 2000–2025




La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

HPV

- Le taux de couverture vaccinale pour la première dose du vaccin contre le HPV (HPV1) chez les filles s'élevait à 60 % en 2025, soit un taux supérieur à celui de 47 % enregistré en 2024.
- Le taux de couverture pour la dernière dose (HPVc) s'élevait à 60 % en 2025, soit un taux supérieur à celui de 47 % enregistré en 2024.
- La couverture HPVc reste bien en deçà de l'objectif de 90 % de l'IA2030, bien qu'elle soit en hausse.
- En 2025, 2.1 million filles n'avaient reçu aucun vaccin contre le HPV.
- Dans Western Africa, 12 pays sur 15 (soit 80 %) avaient mis en place la vaccination contre le HPV en 2025.
 - Les estimations de la couverture vaccinale contre le HPV établies par le WUENIC sont disponibles pour l'ensemble des 12 pays concernés pour l'année 2025.
- Les 3 pays qui n'avaient pas encore mis en place la vaccination contre le VPH sont les suivants : Guinea, Guinea-Bissau, and Niger.

Couverture vaccinale contre le HPV1 et le HPVc et femmes non vaccinées au fil du temps, Western Africa, 2010–2025




La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Pays prioritaires bénéficiant d'un soutien pour se remettre de la pandémie de COVID-19

- Sur les 35 pays ayant bénéficié d'un soutien mondial dans le cadre de l'initiative « Big Catch-up », 10 font partie de l'Western Africa.
 - Burkina Faso, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Niger, et Togo ont entièrement retrouvé leurs niveaux de 2019 pour la DTP3, voire les ont dépassés.
 - Nigeria est en passe de retrouver les niveaux de 2019 en matière de DTP3.
 - 3 pays (Benin, Cote d'Ivoire, et Gambia) ne se sont pas encore remis de la crise, affichant une stagnation ou un recul par rapport aux niveaux de 2019 pour la DTP3.
 - 3 pays (Burkina Faso, Guinea, et Niger) n'ont pas enregistré de baisse des taux de couverture vaccinale pour la DTP3 par rapport à 2019.

Reprise de la couverture du programme DTP3 après la pandémie de COVID-19, Western Africa

Cercle vide = 2019 (référence d'avant la pandémie) ; cercle plein = 2025



La ligne pointillée indique l'objectif de 90 % de couverture fixé par l'IA2030.
 Les pays mentionnés sont les pays prioritaires du programme « Big Catch-Up » sur Western Africa.
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Méthodologie de recouvrement

Cette analyse suit l'évolution de la couverture vaccinale contre la diphtérie, la tétanos et la coqueluche (DTP3) de 2019 à 2025 afin d'évaluer la reprise post-pandémique. Les pays sont classés en fonction de leurs progrès par rapport aux niveaux de référence de 2019 :

- **Récupéré ou renforcé:** La couverture pour l'année 2025 est égale ou supérieure à celle de 2019.
- **Partiellement récupéré:** Le taux de couverture en 2025 reste inférieur aux niveaux de 2019, mais s'est amélioré d'au moins 3 points de pourcentage par rapport à son niveau le plus bas atteint en 2020 ou 2021.
- **Inférieurs aux niveaux de 2019:** La couverture en 2025 reste inférieure aux niveaux de 2019 et n'a progressé que de moins de 3 points de pourcentage par rapport à son niveau le plus bas atteint en 2020 ou 2021.

Annexe

Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC)

Chaque année, l'OMS et l'UNICEF examinent les données nationales sur la vaccination des États membres, y compris la couverture administrative et officielle, les estimations des enquêtes et les informations contextuelles, et utilisent une approche de triangulation des données basée sur des règles pour évaluer la couverture. Les estimations sont produites de manière indépendante, sans emprunter de données à d'autres pays, et ne sont pas basées sur des ajustements ad hoc. Dans certains cas, elles reposent sur une source unique, généralement la couverture déclarée au niveau national. Lorsque les données pour une année pays-vaccin spécifique ne sont pas disponibles, les valeurs des années adjacentes sont interpolées ou extrapolées, et les sources contradictoires sont évaluées pour déterminer l'estimation la plus fiable, en tenant compte des biais potentiels et des avis d'experts.

Méthodes:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Ces points clés présentent les dernières estimations du WUENIC (publiées le 15 juillet 2026).

Définitions des termes de vaccination :

- Bacillus Calmette-Guérin (BCG) : vaccin contre la tuberculose
- Dose de naissance contre l'hépatite B, administrée dans les 24 heures suivant la naissance (HepBB)
- Vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, première dose (DTC1) et troisième dose (DTC3)
- Vaccin contre l'hépatite B, troisième dose (HepB3)
- Vaccin contre l'Haemophilus influenzae de type b, troisième dose (Hib3)
- Vaccin antipoliomyélitique inactivé, première dose (VPI1) et dernière dose (VPIc)
- Vaccins contenant la valence rougeole, première dose (VAR1) et seconde dose (VAR2)
- Vaccin contre le rotavirus, dernière dose (RotaC)
- Vaccin pneumococcique, dernière dose (PCV)
- Vaccin contre la fièvre jaune (YFV)
- Vaccin contre le méningocoque A (MengA)
- Vaccin contre le virus du papillome humain, première dose (HPV1) et dernière dose (HPVc)

Ressources additionnelles : <https://data.unicef.org/resources/immunization/>