



Burundi

Révision WUENIC 2025,
Publié le 15 juillet 2026



Traduit à l'aide de l'API DeepL Pro



Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC), révision 2025

Chaque année, l'OMS et l'UNICEF examinent conjointement les documents soumis par les États membres sur la couverture vaccinale nationale, y compris la couverture administrative et officielle annuelle, les rapports d'enquête finalisés et les données provenant de la littérature publiée et de la littérature grise. Les données sont triangulées en tenant compte des biais potentiels et des avis d'experts locaux afin de différencier les données empiriques représentatives des données potentiellement trompeuses, et d'évaluer les niveaux de couverture les plus probables pour chaque pays.

L'OMS et l'UNICEF produisent des estimations spécifiques à chaque pays en examinant les données de chaque pays de manière indépendante, sans emprunter celles d'autres pays lorsque des données sont manquantes. Les estimations ne sont pas des ajustements ponctuels des chiffres déclarés et peuvent s'appuyer sur une seule source empirique, généralement la couverture déclarée au niveau national. Lorsqu'il n'existe aucune donnée pour un pays, un vaccin ou une année spécifiques, les données antérieures et postérieures sont interpolées. Si les sources sont contradictoires ou varient considérablement, l'estimation la plus plausible est sélectionnée après avoir pris en compte les biais potentiels.

Cette présentation PowerPoint présente les dernières estimations du WUENIC (publiées le 15 juillet 2026), en utilisant les projections démographiques mondiales du UNPD (WPP 2024) pour les moyennes pondérées en fonction de la population et pour calculer le nombre absolu d'enfants vaccinés et non vaccinés/n'ayant reçu aucune dose.

Méthodes: • [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes.](#)

- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach.](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage.](#)
- [Danovaro-Holliday et al. 2021. Compliance of WUENIC with Guidelines for Accurate and Transparent Health Estimates Reporting \(GATHER\) criteria.](#)

Définitions des termes relatifs à la vaccination

Couverture vaccinale

Pourcentage de nourrissons (enfants de moins d'un an) ayant reçu certaines doses de vaccin. Par exemple, la couverture du DTC3 est le pourcentage de nourrissons ayant reçu les trois doses de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC).

Non vacciné

Un nourrisson qui n'a pas reçu la première dose d'une série de vaccins. Le terme « zéro dose » est utilisé pour décrire les enfants qui n'ont pas reçu la première dose du DTC1.

Sous-vacciné

Nourrisson qui a reçu certaines des doses de vaccin recommandées dans le calendrier national, mais pas toutes.

Doses de vaccin

- Bacille de Calmette-Guérin (BCG) : vaccin contre la tuberculose
- Hépatite B : dose de naissance, administrée dans les 24 heures suivant la naissance (HepBB)
- Vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, première dose (DTP1) et troisième dose (DTP3)
- Vaccin contre l'hépatite B, troisième dose (HepB3)
- Vaccin contre l'haemophilus influenzae de type b, troisième dose (Hib3)
- Vaccin antipoliomyélitique inactivé, première dose (IPV1) et dernière dose (IPVC)
- Vaccin contenant de la rougeole, première dose (MCV1) et deuxième dose (MCV2)
- Vaccin antirotavirus, dernière dose (RotaC)
- Vaccin antipneumococcique, dernière dose (PCVC)
- Vaccin contre la fièvre jaune (YFV)
- Vaccin méningococcique A (MengA)
- Vaccin contre le papillomavirus humain, première dose (HPV1) et dernière dose (HPVc) : vaccin destiné à protéger contre certains types de papillomavirus humains pouvant entraîner un cancer ou des verrues génitales.

L'Agenda 2030 pour la vaccination (IA2030)

L'AI2030 est une stratégie mondiale approuvée par l'Assemblée mondiale de la santé qui vise à faire en sorte que chacun, partout et à tout âge, bénéficie de vaccins pour améliorer sa santé et son bien-être d'ici à 2030. Il se concentre sur l'augmentation de la couverture vaccinale, l'équité, la durabilité et la préparation aux pandémies, tout en promouvant la vaccination tout au long de la vie et en intégrant la vaccination à d'autres services de santé.

Concepts clés

- L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) fournit des recommandations mondiales en matière de vaccination, adaptées par les pays en fonction des besoins locaux. Seuls les vaccins DTC, antipoliomyélitique et antirougeoleux sont utilisés dans tous les pays.
- Le DTC1 est un indicateur de l'accès aux services de vaccination systématique. Lorsqu'il n'est pas administré, il sert de proxy pour identifier les enfants qui n'ont reçu aucun vaccin, également appelés « enfants zéro dose ». Une couverture élevée en DTC1 indique un bon accès aux services de vaccination, tandis qu'une couverture faible suggère des difficultés à atteindre les enfants avec les vaccins essentiels.
- Le DTC3 est un indicateur largement utilisé de la performance des programmes de vaccination. Il reflète la capacité d'un pays à fournir des services de vaccination systématique et à garantir la protection des enfants contre les maladies graves. Le DTC3 fait l'objet d'un suivi mondial et constitue une mesure clé des efforts de vaccination d'un pays.
- L'abandon du DTC1-DTC3 mesure le pourcentage d'enfants ayant reçu le DTC1 mais pas le DTC3. Il met en évidence les enfants perdus de vue tout au long du parcours de vaccination, soulignant ainsi les faiblesses potentielles dans la prestation des services et le suivi.
- Le MCV1 (généralement recommandé entre 9 et 12 mois) évalue la capacité à administrer les vaccins plus tard dans la petite enfance. Il sert de traceur pour la protection contre la rougeole et constitue un bon indicateur de la performance du système de santé.
- Le vaccin contre le HPV protège contre certains types spécifiques du virus du papillome humain (HPV) et sert à mesurer le cycle de vie de la vaccination.
- Parmi les autres indicateurs clés, citons le PCVC et le MCV2, qui sont utilisés pour suivre les objectifs de développement durable (ODD).
- Ensemble, ces indicateurs offrent un moyen cohérent et comparable de suivre les progrès de la vaccination, d'identifier les communautés oubliées et de suivre les objectifs mondiaux, notamment ceux du Programme de vaccination à l'horizon 2030 (PA2030) et des Objectifs de développement durable (ODD).

Messages clés

- La couverture vaccinale contre la DTP1 est restée stable à 89 % entre 2024 et 2025.
- La couverture vaccinale contre la DTP3 est restée stable à 89 % entre 2024 et 2025.
- Le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose était à peu près le même en 2025. Cela représente 50 000 enfants non vaccinés, exposés aux maladies évitables par la vaccination, et moins de 100 autres dont la protection est incomplète.
- Le Burundi représentait 1,8 % des enfants n'ayant reçu aucune dose en Afrique de l'Est et du Sud (<keep>ESAR</keep>) et 0,4 % des enfants n'ayant reçu aucune dose à l'échelle mondiale.
- La couverture de la première dose de vaccin contre la rougeole (MCV1) est restée stable à 86 % entre 2024 et 2025. 64 000 enfants n'ont pas reçu la première dose de vaccin contre la rougeole.
- La couverture vaccinale de la deuxième dose contre la rougeole (MCV2) est restée stable à 80 % entre 2024 et 2025.
- Le vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) n'a pas été introduit.

Calendrier de vaccination, 2025

Level	Vaccine	Dose number and age administered			
		1	4	2	3
National	BCG	Birth			
National	DTWP (booster)		18 months		
National	DTWPHIBHEPB	6 weeks		10 weeks	14 weeks
National	IPV	14 weeks			
Subnational	MALARIA	6 months	18 months	7 months	9 months
National	MR	9 months		18 months	
National	OPV	Birth	14 weeks	6 weeks	10 weeks
National	PCV	6 weeks		10 weeks	14 weeks
National	Rotavirus	6 weeks		10 weeks	

Ce tableau présente le calendrier national de vaccination 2025 pour les services de routine dans Burundi, tel que rapporté dans le formulaire commun de notification sur la vaccination (JRF) de l'OMS/UNICEF.

Chaque ligne correspond à un vaccin ou à un vaccin combiné, indiquant s'il est administré au niveau national ou infranational. Le calendrier précise le nombre de doses et les âges recommandés pour l'administration. Seuls les vaccins destinés aux enfants et aux adolescents pertinents pour le WUENIC sont inclus.

Années d'introduction du vaccin

Vaccine	National introduction	Partial introduction
HPV (Human papillomavirus) vaccine	Not introduced	
HepB birth dose	Not introduced	
Hepatitis B vaccine	2004	
Hib (Haemophilus influenzae type B) vaccine	2004	
IPV (Inactivated polio vaccine)	2015	
IPV (Inactivated polio vaccine) 2nd dose	Not introduced	
Malaria vaccine	Not introduced	2025
Measles-containing vaccine 2nd dose	2013	
Meningococcal meningitis vaccines (any strain)	Not introduced	
Mumps vaccine	Not introduced	
PCV (Pneumococcal conjugate vaccine)	2011	
RSV (Respiratory syncytial virus) immunization strategy	Not introduced	
Rotavirus vaccine	2013	
Rubella vaccine	2017	
Typhoid conjugate vaccine	Not introduced	

Ce tableau indique l'année d'introduction de chaque vaccin dans Burundi. Si un vaccin a été suspendu, aucune année d'introduction n'est indiquée, mais s'il a été suspendu puis réintroduit, l'année de réintroduction est mentionnée. Les années d'introduction peuvent correspondre à une mise en place à l'échelle nationale, à une mise en place partielle (infranationale) ou à une introduction ciblée sur des groupes à risque spécifiques ou des zones à haut risque, comme indiqué dans les en-têtes de colonne.

Rupture des stocks de vaccins

Vaccines / supplies	2021	2022
DTP-containing vaccine	National (0.5m) and subnational	
YFV	National (3m)	National (2m)

Ce tableau présente les ruptures de stock de vaccins infantiles relevant du WUENIC signalées au niveau national et infranational au cours des cinq dernières années. Lorsque ces informations sont disponibles, la durée des ruptures de stock au niveau national est indiquée en mois. Seuls les vaccins ayant fait l'objet d'une rupture de stock au cours de la période spécifiée sont affichés.

Une rupture de stock désigne une période pendant laquelle les points de stockage et de distribution des vaccins (par exemple, les entrepôts nationaux ou régionaux) sont complètement épuisés, y compris les stocks tampons, et ne sont pas en mesure de fournir des vaccins aux entrepôts ou aux établissements de niveau inférieur. Il est important de noter que des ruptures de stock au niveau des établissements peuvent toujours se produire même lorsque les entrepôts de niveau supérieur disposent de stocks. Les ruptures de stock, en particulier celles qui sont prolongées, peuvent avoir un impact négatif sur la couverture vaccinale.

En 2025, la couverture vaccinale est restée inchangée par rapport à 2024 pour tous les antigènes, aucun d'entre eux n'atteignant une couverture d'au moins 90 %, ce qui témoigne d'une progression limitée et souligne la nécessité de réaliser de nouveaux progrès pour garantir que tous les enfants soient vaccinés.

Couverture vaccinale, Burundi, 2000-2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	85	87	88	90*	91*	89*	98	97	99	98	93	90	98	95	92	93	93	92	91	93	83	95	94	89	89	89
DTP1	88	90	91	93	95	96*	99	99	98	99	99	99	98	98	98	97	97	94	94	97	98*	96*	93	89	89	89
DTP3	80	81	81	82	83	87*	92	99	92	94	96	96	96	96	95	94	94	91	90	93	93*	94*	91	89	89	89
Hib3					83	87*	92	99	92	94	96	96	96	96	95	94	94	91	90	93	93*	94*	91	89	89	89
HepB3					83	87*	92	99	92	94	96	96	96	96	95	94	94	91	90	93	93*	94*	91	89	89	89
PCVC												14	96	96	95	94	94	91	90	93	93	94	91	88	88	88
RotaC															85	96	96	93	92	95	96	94	91	89	89	89
IPV1																4	60*	0*	50*	92	98*	94	91	86	86	86
MCV1	72	73	75	76	78*	87*	92	88	84	91	92	93	93	98	94	93	93	90	88	92	90	90	89	86	86	86
RCV1																		90	88	92	90	90	89	86	86	86
MCV2														51	60	65	72	75	77	80	83	85	85	80	80	80



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025.

Note : Informations boursières disponibles depuis 2003.

Un astérisque (*) indique les endroits où il y a eu une rupture de stock de vaccins au niveau national ou infranational.

Cette carte thermique montre les tendances en matière de couverture vaccinale depuis 2000, les cellules vertes indiquant une couverture de 90 % ou plus.

En 2025, aucun des 11 vaccins du calendrier n'a atteint une couverture de 90 % ou plus. La couverture vaccinale variait entre 80 % et 89 %.


Depuis 2004, des estimations ont été réalisées pour 7 nouveaux vaccins. Le RCV1 est le vaccin le plus récent déclaré (2017) ; il a atteint une couverture de 86 % en 2025.

En 2025, le Burundi n'a signalé aucune rupture de stock de vaccins ou de fournitures.



WUENIC 2025 revision

Couverture des vaccins essentiels pour les enfants, Burundi, 2000-2025



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025

Ce graphique montre les tendances en matière de couverture vaccinale pour les vaccins DTP et rougeole. Il s'agit d'antigènes clés pour évaluer les programmes nationaux de vaccination.


En 2025, le taux de couverture du DTP1 (indicateur de l'accès aux services de vaccination) s'élevait à 86 %.

Le taux de couverture du DTP3 — indicateur de la qualité de la prestation des services de vaccination aux enfants par les pays — n'a pas atteint l'objectif de 90 %, mais s'en est rapproché.

L'OMS recommande aux pays d'atteindre une couverture d'au moins 95 % avec les deux premières doses (MCV1 et MCV2) du vaccin contre la rougeole. La première dose (MCV1) assure une protection initiale, tandis que la deuxième dose (MCV2) garantit une immunité à long terme et comble les lacunes en matière de couverture vaccinale.

En 2025, le taux de couverture du MCV1 était de NA et celui du MCV2 de NA.

Couverture vaccinale comparée à celle des autres pays de la région, ESAR, 2025



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Remarque : Les codes ISO des pays sont affichés. La couverture (en bdi) est indiquée dans les en-têtes. La couverture moyenne régionale est représentée par la ligne pointillée.

DTP1


En 2025, la couverture vaccinale pour le DTP1 était de 89 % et celle pour le DTP3 de 89 %, ce qui laisse 50 000 enfants non vaccinés ou sous-vaccinés, dont 50 000 n'ayant reçu aucune dose et moins de 100 ne bénéficiant que d'une protection partielle.

L'objectif principal du Programme de vaccination 2000 est de rendre la vaccination accessible à tous, partout dans le monde, d'ici 2030.

Ce graphique montre les tendances en matière de couverture vaccinale pour la première dose (DTP1) et la troisième dose (DTP3) du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) au Burundi. Le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose et le taux d'abandon de la vaccination DTC au Burundi.


En 2025, la couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC1) au Burundi est restée stable à 89 %. Le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin DTC (enfants n'ayant reçu aucune dose) est resté stable, passant de 50 000 en 2024 à 50 000 en 2025. Le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin DTC (enfants n'ayant reçu aucune dose) est resté stable, passant de 50 000 en 2024 à 50 000 en 2025.

La couverture vaccinale contre la DTP3 est restée stable à 89 % en 2025, laissant 50 000 enfants exposés à des maladies évitables par la vaccination.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
 Note : les lignes indiquent la couverture vaccinale et les barres indiquent le nombre d'enfants.
 Les enfants n'ayant reçu aucune dose sont ceux qui n'ont pas reçu le vaccin DTC1.


En 2025, la couverture vaccinale contre la DTP1 au Burundi s'élevait à 89 %, soit 8 points de pourcentage de moins qu'en 2019 et 1 point de pourcentage de moins que la moyenne mondiale (90 %).



En 2025, la couverture vaccinale contre la DTP1 au Burundi (89 %) était inférieure de 1 point de pourcentage à la moyenne mondiale (90 %) et supérieure de 4 points de pourcentage à la moyenne de l'ensemble des pays de l'ESAR (85 %).


La couverture nationale du DTP1 était inférieure de 8 points de pourcentage à celle de 2019 (97 %).

Cela correspond à 50 000 enfants n'ayant reçu aucune dose en 2025, contre 13 000 en 2019.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : différence de couverture par rapport à 2019 - les valeurs supérieures à zéro indiquent une couverture supérieure à celle de 2019 et les valeurs inférieures à zéro indiquent une couverture inférieure à celle de 2019.

En 2025, le Burundi figurait parmi les pays affichant la couverture vaccinale la plus élevée, mais figurait également parmi les dix pays de la région comptant le plus grand nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : les barres sont classées par ordre croissant de couverture. Les chiffres dans les bulles indiquent le classement 10 le plus élevé en fonction du nombre absolu d'enfants zéro dose.

Ce graphique montre la couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et le polio (DTC1) dans les pays de la région ESAR, classés du plus faible au plus élevé, ainsi que le classement des 10 pays comptant le plus grand nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose, sur la base des chiffres absolus.


En 2025, le Burundi occupait la 12e place sur 21 pays en termes de couverture vaccinale la plus faible contre la coqueluche, le tétanos et la diphtérie (1er dose) (sur la base de classements ex æquo).

Le Burundi figurait parmi les 10 pays comptant le plus grand nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose (10e place).

Remarque : les pays à forte cohorte peuvent compter un nombre élevé d'enfants n'ayant reçu aucune dose malgré une couverture vaccinale élevée. Il est important de tenir compte à la fois de la couverture vaccinale et du nombre absolu d'enfants non vaccinés afin de ne pas négliger les pays vulnérables dont les données de naissance sont faibles.



Classement des pays selon le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose, ESAR, 2021-2025



Ce graphique compare le classement des pays dans la région en fonction du nombre absolu d'enfants n'ayant reçu aucune dose, le rang 1 représentant le pays comptant le plus grand nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose.


En 2021, le Burundi occupait la 14^e place sur 21 pays, avec 18 000 enfants n'ayant reçu aucune dose.

En 2025, le Burundi occupait la 10^e place sur 21 pays, avec 50 000 enfants n'ayant reçu aucune dose.

Remarque : le nombre absolu d'enfants n'ayant reçu aucune dose est basé sur une combinaison des résultats du programme et de la taille de la population cible d'enfants survivants. Les pays peuvent grimper dans le classement malgré une baisse du nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose, car le classement dépend également des résultats des autres pays de la région.

Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
 Note : le nombre entre parenthèses correspond au nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose.
 Les enfants nuls sont ceux qui n'ont pas reçu le DTC1.

Il faut vacciner davantage d'enfants chaque année pour atteindre l'objectif IA2030 consistant à réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose d'ici 2030, alors qu'on prévoit une augmentation modérée du nombre de nourrissons survivants.



IA2030 appelle tous les pays à réduire de moitié d'ici 2030 le nombre d'enfants non vaccinés en 2019. Ce graphique montre le nombre annuel d'enfants à vacciner pour atteindre l'objectif ZD.


L'initiative IA2030 appelle tous les pays à réduire de moitié d'ici 2030 le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin en 2019. Ce graphique indique le nombre annuel d'enfants devant être vaccinés pour atteindre l'objectif fixé concernant les enfants n'ayant reçu aucune dose.

Le Burundi devrait connaître une augmentation modérée (10 000 à 50 000) du nombre de nourrissons survivants d'ici 2030. Par conséquent, le maintien de la couverture vaccinale actuelle nécessite de vacciner un nombre croissant d'enfants.

Pour atteindre l'objectif « zéro dose » de l'IA2030, il faudra vacciner chaque année davantage d'enfants (~3,47 %) avec le DTP1. Cela nécessitera un renforcement des capacités du programme de vaccination et du système de santé.

En 2025, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose dépassait de 413 % l'objectif annuel fixé par l'IA2030, ce qui compromettait sérieusement la réalisation de l'objectif de 2030 si des mesures n'étaient pas prises de toute urgence.

Estimation du nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose, 2000-2025 et objectif pour 2030, Burundi



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025

Remarque : Le Programme de vaccination 2030 (IA2030) appelle tous les pays à réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin en 2019 d'ici 2030. Les barres bleu foncé représentent le nombre estimé d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin entre 2000 et 2025, tandis que la barre bleu clair représente l'objectif à atteindre d'ici 2030.

La ligne et les points indiquent les progrès annuels et la trajectoire à suivre pour atteindre l'objectif d'ici 2030, sur la base d'une diminution linéaire.

IA2030 vise à ne laisser personne de côté en matière de vaccination et appelle tous les pays à réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin d'ici 2030.

Ce graphique montre :

- Le nombre estimé d'enfants non vaccinés en 2000-2025 (barres bleu foncé)
- L'objectif zéro dose d'ici 2030 (barre bleu clair)
- Trajectoire pour atteindre l'objectif 2030 sur la base d'une diminution linéaire (points)

En 2025, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose était supérieur d'environ 413 % au nombre annuel prévu pour atteindre l'objectif, selon une trajectoire de baisse linéaire.

Pour que la couverture vaccinale augmente, le nombre d'enfants vaccinés doit croître à un rythme plus rapide que celui de la croissance démographique.

Le taux de couverture du DTP1 en 2025 (89 %) était inférieur à celui de 2019 (97 %).


Le nombre d'enfants vaccinés avec le DTP1 a diminué de 4 % par rapport à 2019.

Le nombre de nourrissons survivants a augmenté d'environ 5 % par rapport à 2019.

En 2025, moins d'enfants ont été vaccinés qu'en 2019.

En 2025, le nombre de nourrissons en vie (population cible) était plus élevé qu'en 2019.



Pour que la couverture vaccinale augmente, le nombre d'enfants vaccinés doit croître à un rythme plus rapide que celui de la croissance démographique.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025

DTP3

En 2025, le taux de couverture de la DTP3 au Burundi s'élevait à 89 % ; ce chiffre est inférieur de 4 points de pourcentage à celui de 2019, mais supérieur aux moyennes mondiales et régionales.




Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : différence de couverture par rapport à 2019 - les valeurs supérieures à zéro indiquent une couverture supérieure à celle de 2019 et les valeurs inférieures à zéro indiquent une couverture inférieure à celle de 2019.

En 2025, la couverture du DTP3 au Burundi (89 %) était supérieure de 4 points de pourcentage à la moyenne mondiale (85 %) et de 9 points de pourcentage à la moyenne de l'ensemble des pays <keep>ESAR</keep> (80 %).

La couverture nationale de la DTP3 était inférieure de 4 points de pourcentage à celle de 2019 (93 %).

Cela correspond à 50 000 enfants non vaccinés ou sous-vaccinés en 2025, contre 30 000 enfants non vaccinés ou sous-vaccinés en 2019.

En 2025, le Burundi figurait parmi les pays affichant la couverture vaccinale la plus élevée et ne figurait pas parmi les dix pays de la région comptant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : les barres sont classées par ordre croissant de couverture. Les chiffres dans les bulles indiquent le classement 10 le plus élevé en fonction du nombre absolu d'enfants non vaccinés et sous-vaccinés.

Ce graphique montre la couverture vaccinale DTP3 dans les pays de la région ESAR, classés du plus faible au plus élevé, ainsi que le classement des 10 pays comptant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés, en chiffres absolus.


En 2025, le Burundi occupait la 14e place sur 21 pays en termes de couverture vaccinale la plus faible pour le DTP3 (en cas d'égalité de classement).

Le Burundi ne figurait pas parmi les 10 pays comptant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés.

Remarque : les pays à forte cohorte peuvent compter un nombre élevé d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés malgré une couverture vaccinale élevée. Il est important de tenir compte à la fois de la couverture vaccinale et du nombre absolu d'enfants non vaccinés afin de ne pas négliger les pays vulnérables dont les cohortes de naissance sont faibles.



Pour que la couverture vaccinale augmente, le nombre d'enfants vaccinés doit croître à un rythme plus rapide que celui de la croissance démographique.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : Les enfants non vaccinés comprennent les enfants non vaccinés et les enfants sous-vaccinés.

Le taux de couverture du DTP3 en 2025 (89 %) était inférieur à celui de 2019 (93 %).

Le nombre d'enfants vaccinés par le DTP3 est resté stable par rapport à 2019.

Le nombre de nourrissons survivants a augmenté d'environ 5 % par rapport à 2019.

En 2025, le nombre d'enfants vaccinés était à peu près le même qu'en 2019.

En 2025, le nombre de nourrissons survivants (population cible) était supérieur à celui de 2019.

Pour que la couverture vaccinale augmente, le nombre d'enfants vaccinés doit croître à un rythme plus rapide que celui de la croissance démographique.


MCV1

La couverture vaccinale contre la rougeole (MCV1) est restée stable à 86 % en 2025, soit un niveau inférieur aux 95 % nécessaires pour prévenir les épidémies, laissant ainsi 64 000 enfants sans aucune protection contre la rougeole. La couverture vaccinale de la deuxième campagne de vaccination (MCV2) est également restée stable à 80 %, soit un taux inférieur à l'objectif de 90 % fixé par l'IA2030.

La couverture vaccinale de la deuxième campagne de vaccination (MCV2), est également restée stable à 80 %, soit un taux inférieur à l'objectif de

90 % fixé par l'IA2030.

Estimation de la couverture et du nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés pour le vaccin MCV, Burundi, 2000-2025




Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
 Note : Les lignes indiquent la couverture vaccinale et les barres le nombre d'enfants.

En raison de sa forte transmissibilité, la rougeole continue de constituer une menace majeure pour la santé publique. Elle agit comme un « charbon dans une mine », révélant toute lacune immunitaire au sein de la population. La couverture vaccinale contre la rougeole (MCV) est donc souvent utilisée comme indicateur de protection.

Le pourcentage d'enfants ayant reçu la première dose du vaccin contre la rougeole (MCV1) d'enfants ayant reçu la première dose du vaccin contre la rougeole (national) de vaccination est resté stable à 86 %. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019, où la couverture vaccinale était de 92 %. 64 000 enfants n'ont pas reçu leur première dose de vaccin contre la rougeole dans le cadre du calendrier de vaccination systématique de la rougeole (MCV1) systématiquement administrée aux enfants âgés de 18 mois à 5 ans. La couverture vaccinale pour la MCV2 est restée stable à 80 % en 2025, généralement administrée aux enfants âgés de 18 mois à 5 ans. La couverture vaccinale pour la MCV2 est restée stable à 80 % en 2025.


En 2025, le taux de couverture du vaccin MCV1 au Burundi s'élevait à 86 % ; ce chiffre est inférieur de 6 points de pourcentage à celui de 2019, mais supérieur aux moyennes mondiales et régionales.



En 2025, la couverture vaccinale contre le MCV1 au Burundi (86 %) était supérieure de 2 points de pourcentage à la moyenne mondiale (84 %) et de 9 points de pourcentage à la moyenne de l'ensemble des pays <keep>ESAR</keep> (77 %).


La couverture nationale du MCV1 était inférieure de 6 points de pourcentage à celle de 2019 (92 %).

Cela correspond à 64 000 enfants non vaccinés en 2025, contre 35 000 enfants non vaccinés en 2019.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : différence de couverture par rapport à 2019 - les valeurs supérieures à zéro indiquent une couverture supérieure à celle de 2019 et les valeurs inférieures à zéro indiquent une couverture inférieure à celle de 2019.

En 2025, le Burundi figurait parmi les pays affichant la couverture vaccinale la plus élevée et ne figurait pas parmi les dix pays de la région comptant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : les barres sont classées par ordre croissant de couverture. Les chiffres dans les bulles indiquent le classement 10 le plus élevé en fonction du nombre absolu d'enfants non vaccinés.


Ce graphique montre la couverture vaccinale contre la MCV1 dans les pays de ESAR, classés du plus faible au plus élevé, ainsi que le classement des 10 pays comptant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés, en chiffres absolus.

En 2025, le Burundi se classait au 14e rang sur 21 pays pour la couverture vaccinale la plus faible contre le MCV1 (en cas d'égalité).

Le Burundi ne figurait pas parmi les 10 pays comptant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés.

Remarque : les pays à forte cohorte peuvent compter un nombre élevé d'enfants non vaccinés malgré une couverture vaccinale élevée. Il est important de tenir compte à la fois de la couverture vaccinale et du nombre absolu d'enfants non vaccinés afin de ne pas négliger les pays vulnérables à faible cohorte.

Pour que la couverture vaccinale augmente, le nombre d'enfants vaccinés doit croître à un rythme plus rapide que celui de la croissance démographique.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025

Le taux de couverture vaccinale contre le MCV1 en 2025 (86 %) était inférieur à celui de 2019 (92 %).

Le nombre d'enfants vaccinés avec le MCV1 a diminué de 2 % par rapport à 2019.

Le nombre de nourrissons survivants a augmenté d'environ 5 % par rapport à 2019.


En 2025, le nombre d'enfants vaccinés était inférieur à celui de 2019.

En 2025, le nombre de nourrissons en vie (population cible) était plus élevé qu'en 2019.

Pour que la couverture vaccinale augmente, le nombre d'enfants vaccinés doit croître à un rythme plus rapide que celui de la croissance démographique.

En 2025, le Burundi a enregistré une baisse du nombre de cas de rougeole par rapport à 2024, tandis que la couverture vaccinale pour la première dose de vaccin contre la rougeole (MCV1) s'élevait à 86 % et celle pour la deuxième dose (MCV2) à 80 %.

Tendances du nombre de cas de rougeole et de la couverture vaccinale MCV, Burundi, 2012-2025



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025; Cas de rougeole et de rubéole signalés et taux d'incidence par les États membres de l'OMS, au 8 juillet 2025. Données provisoires basées sur les données mensuelles communiquées à l'OMS (Genève) en juillet 2025. Note : les astérisques (*) indiquent les années où il y a eu des ruptures de stock de vaccins contre la rougeole et les carets (^) indiquent les années où des campagnes de vaccination contre la rougeole ont été menées (au niveau national ou infranational).

En 2025, on a recensé au total 783 cas confirmés de rougeole au Burundi. La même année, le taux de couverture vaccinale pour la première dose de vaccin contre la rougeole (MCV1) était de 86 % et celui pour la deuxième dose (MCV2) de 80 %.

Le nombre de cas en 2025 était inférieur de 70 % à celui de 2024 (n = 2 616).

C'est en 2024 que le nombre de cas de rougeole a été le plus élevé (n = 2 616). Cette année-là, la couverture vaccinale de la première dose (MCV1) était de 86 %.


Le Burundi a signalé des ruptures de stock de vaccins contre la rougeole en 2004 et 2005.

Des activités ou campagnes de vaccination d'appoint à base de vaccins contenant le virus de la rougeole ont été menées en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.

Vaccination des enfants : Tableaux supplémentaires

En 2025, le taux d'abandon entre la DTP1 et la DTP3 était nul (0 %) et celui entre la DTP1 et le MCV1 était faible (3 %) au Burundi, ce qui témoigne d'une très bonne capacité à administrer la série primaire dès le plus jeune âge, mais aussi d'une bonne capacité à assurer la série complète de vaccins pendant la petite enfance.

Abandon de la vaccination, Burundi, 2000-2025



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Classification des abandons : < 5 % = faible, 5-10 % = moyen, > 10 % = élevé

Les taux d'abandon indiquent le pourcentage d'enfants qui ont reçu le DTC1, mais pas le DTC3/MCV1. De faibles taux d'abandon indiquent un taux élevé de rétention des enfants dans les programmes de vaccination.

Ce graphique montre les tendances des taux d'abandon entre le DTC1 et le DTC3, et entre le DTC1 et le MCV1.


En 2025, la quasi-totalité des enfants ayant reçu le DTP1 ont également reçu le DTP3 (à gauche), et 3 % des enfants ayant reçu le DTP1 n'ont pas reçu le MCV1 (à droite).

L'absence d'abandon du DTP témoigne d'une très bonne capacité à administrer une série complète de vaccins dès le plus jeune âge. Le faible taux d'abandon du DTP-MCV témoigne d'une bonne fidélisation aux programmes de vaccination et d'une capacité à administrer une série complète de vaccins pendant la petite enfance (jusqu'à un an).

En 2025, le taux d'abandon du DTP au Burundi était inférieur au taux mondial, tandis que le taux d'abandon du DTP-MCV était également inférieur au taux mondial.

En 2025, le Burundi affichait la couverture la plus faible pour le MCV2 (80 %), tandis que la plupart des autres vaccins de routine se situaient entre 86 et 89 % ; 6 antigènes ont connu une baisse depuis 2019, et 7 antigènes sont restés stables depuis 2024.

Couverture vaccinale recommandée pour les enfants, Burundi, 2000-2025



Ce graphique montre les tendances en matière de couverture vaccinale pour certains vaccins de routine recommandés pendant l'enfance.


En 2025, le MCV2 affichait la couverture la plus faible (80 %), suivi de l'IPV1 et du MCV1 (86 %).

Par rapport à 2019, la couverture vaccinale de six vaccins a diminué (BCG, DTP1, DTP3, IPV1, MCV1 et ROTAC) et celle d'un vaccin est restée stable (MCV2).

Par rapport à 2024, la couverture vaccinale de sept vaccins est restée stable (BCG, DTP1, DTP3, IPV1, MCV1, MCV2 et ROTAC).

Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : les libellés des données sont indiqués pour 2000 (ou la première année de déclaration), 2019 et 2025.

Couverture vaccinale (%), Burundi, 2000-2025




Ce graphique présente l'évolution de la couverture vaccinale pour 8 vaccins (série complète).

En 2025, le MCV2 affichait la couverture la plus faible de tous les vaccins (80 %), suivi de l'IPV1, du MCV1 et du vaccin contre la rubéole (86 %).

La couverture vaccinale de 7 vaccins a diminué (DTP3, HEPB3, HIB3, IPV1, MCV1, ROTAC et RUBELLA) et celle d'un vaccin est restée inchangée (MCV2) par rapport à leur couverture respective en 2019.

La couverture de huit vaccins est restée inchangée (DTP3, HEPB3, HIB3, IPV1, MCV1, MCV2, ROTAC et RUBELLA) par rapport à celle de 2024.

Couverture vaccinale (%), Burundi, 2019-2025



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025

Note : la barre grise représente la couverture vaccinale pour toutes les années 2019-2025 et les points représentent la couverture pour des années spécifiques.

La couverture est indiquée pour les vaccins pour lesquels des données sont disponibles pour toutes les années 2019-2025.

Les noms des vaccins sont colorés en fonction de leur couverture par rapport à celle de 2019 : inférieure (rouge), identique (bleu) ou supérieure (vert).

Ce graphique montre la couverture vaccinale pour toutes les années comprises entre 2019 et 2025 (barres grises) et la couverture pour des années spécifiques (points), par vaccin. Il peut être utilisé pour évaluer le retour aux niveaux d'avant la pandémie.

Le taux de couverture du DTP1 a baissé entre 2019 (97 %) et 2024 (89 %). En 2025, ce taux est resté inchangé par rapport à 2024 (89 %), mais était inférieur à celui de 2019. Entre 2019 et 2025, la couverture vaccinale contre la DTP1 a atteint son niveau le plus bas en 2023, 2024 et 2025 (89 %).

En 2024, 10 vaccins présentaient une couverture inférieure à celle de 2019.

En 2025, 10 vaccins présentaient une couverture inférieure à celle de 2019.


En 2025, aucun vaccin ne présentait une couverture inférieure à celle de 2024.



WUENIC 2025 revision

SDG 3.b.1

En 2025, aucun vaccin relevant des ODD n'a atteint l'objectif de couverture de 90 % fixé par les ODD.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : les quatre indicateurs de couverture vaccinale qui contribuent à l'indicateur 3.b.1 des ODD sont les suivants : DTC3, MCV2, PCVC et HPVc
L'objectif mondial du Programme d'immunisation 2030 (IA2030) est d'atteindre une couverture de 90 % pour les quatre antigènes d'ici 2030.
Les données sont manquantes pour les vaccins qui n'ont pas été introduits par le pays ou lorsque des estimations n'ont pas été faites (HPVc).

Quatre indicateurs de couverture vaccinale contribuent à l'Objectif de développement durable 3, indicateur b.1 : DTC3, PCV3, MCV2 et HPV.


L'objectif mondial IA2030 est une couverture de 90 % des quatre antigènes d'ici 2030.

Le Burundi dispose de 3 des 4 vaccins visés par les ODD.

En 2025, le Burundi avait atteint une couverture d'au moins 90 % pour aucun des 4 vaccins.

Ressources supplémentaires

WUENIC country profiles (PDF and interactive versions)




Datasets: WUENIC, HPV, survey database

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	unicef_regio	iso3c	country	vaccine	year	target_grp	coverage	vaccinated	unvaccinated	target
1	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	1982	births	10	57,000	514,000	571,000
2	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	1983	births	10	56,000	503,000	559,000
3	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	1984	births	11	62,000	501,000	563,000
4	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	1985	births	17	100,000	490,000	591,000
5	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	1986	births	18	107,000	489,000	596,000
6	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	1987	births	27	161,000	434,000	595,000
7	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	1988	births	40	238,000	358,000	596,000
8	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	1989	births	38	233,000	380,000	614,000
9	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	1990	births	30	191,000	446,000	637,000
10	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	1991	births	21	134,000	505,000	640,000
11	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	1992	births	19	127,000	541,000	668,000
12	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	1993	births	17			760,000
13	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	1994	births	15			852,000
14	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	1995	births				899,000
15	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	1996	births				932,000
16	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	1997	births				962,000
17	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	1998	births				986,000
18	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	1999	births				1,013,000
19	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	2000	births	30			1,037,000
20	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	2001	births	43	453,000	374,000	1,007,000
21	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	2002	births	46	467,000	548,000	1,015,000
22	ROSA	AFG	Afghanistan	bcg	2002	births				

Country and region-specific slides:

UNICEF, WHO, World Bank, Gavi and African Union regions




Interactive immunization regional snapshots:

UNICEF, WHO, World Bank, Gavi and African Union regions




Country data quality reports (NEW 2026)



Country and region-specific high-level talking points

(NEW 2026)



Ressources supplémentaires

Vous trouverez d'autres sources d'informations sur la vaccination à l'adresse suivante : <https://data.unicef.org/resources/immunization/>

Les profils interactifs des pays du WUENIC sont disponibles à l'adresse suivante : <https://worldhealth.org.shinyapps.io/wuenic-trends/>

Questionnaire de satisfaction

(5 minutes)

Nous souhaitons connaître votre avis sur les regroupements mondiaux (GAVI, Union africaine, Banque mondiale, OMS et UNICEF) et les diapositives PowerPoint par pays élaborés pour la publication des estimations mondiales en matière de vaccination. Vos commentaires nous aideront à comprendre leur utilité et à identifier les points à améliorer.

Merci de prendre quelques instants pour répondre à cette courte enquête et faire entendre votre voix :

<https://forms.office.com/e/Qv1HXxxNZQ>

