


Points de discussion WUENIC: Burkina Faso

Année de révision : 2025

Sommaire

Aperçu	2
DTC1 : Atteindre les enfants zéro dose	4
DTC3 : Un marqueur de la prestation des services de vaccination de routine aux enfants	5
VAR : Le canari dans la mine de charbon	6
HPV	7
Comparaison régionale	8
Vaccins additionnels	9
Annexe	10

Burkina Faso dans la région « Africa »



Aperçu

- Au total, 15 vaccins destinés aux enfants font l'objet d'un suivi dans Burkina Faso ; parmi ceux-ci, 7 ont atteint l'objectif de couverture de 90 % ou plus au cours de l'année 2025.
- Couverture vaccinale pour la première dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC1) était identique en 2025 à celui de 2024 (95 %), couverture vaccinale de la troisième dose du vaccin contenant le DTC (DTC3) était identique en 2025 à celui de 2024 (91 %), et taux de couverture de la première dose du vaccin contre la rougeole (VAR1) était identique en 2025 à celui de 2024 (88 %) en 2025.
- En 2025, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de DTC dans Burkina Faso (35,000) s'élevait à environ 42 % supérieur au nombre annuel proposé pour atteindre l'objectif IA2030 visant à réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose du vaccin DTC d'ici 2030 (25,000), sur la base d'une trajectoire de baisse linéaire.


Taux de couverture vaccinale (%), Burkina Faso, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	81	80	90	83	99	99	99	99	99	99	99	99	97	96	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
HepBB																							49	80	75	75
DTC1	85	87	89	90	90	91	91	92	93	93	93	93	94	94	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
DTC3	45	62	69	79	79	82	86	89	93	92	91	91	90	88	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Hib3							76	89	93	92	91	91	90	88	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
HepB3							76	89	93	92	91	91	90	88	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
PCVC															91	91	91	91	91	91	91	66	91	91	91	91
RotaC														9	91	91	91	91	91	91	88	91	82	83	87	86
VPI1																			45	91	91	91	91	91	91	91
VPIC																							78	85	85	85
VAR1	48	63	64	76	78	84	88	94	94	94	92	89	87	82	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
RCV1																68	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
VAR2																17	50	59	65	71	71	71	71	66	65	65
YFV	38	41	45	60	71	84	88	89	91	93	82	82	87	88	88	88	49	47	85	85	85	85	85	85	85	85
MengA																		68	70	71	71	71	68	66	66	66
HPVc																							16	96	99	95



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Nombre estimé d'enfants n'ayant reçu aucune dose, 2000–2025 et objectif d'ici 2030, Burkina Faso




Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.
 Remarque : Le Programme de vaccination 2030 (IA2030) appelle tous les pays à réduire de moitié d'ici 2030 le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose en 2019.
 Les barres bleu foncé représentent le nombre estimé d'enfants n'ayant reçu aucune dose entre 2000 et 2025, la barre bleu clair correspond au nombre cible d'enfants n'ayant reçu aucune dose d'ici 2030.
 La courbe et les points illustrent les progrès annuels et la trajectoire permettant d'atteindre l'objectif d'ici 2030, sur la base d'une baisse linéaire.

DTC1 : Atteindre les enfants zéro dose

- Le taux de couverture vaccinale de DTC1 s'élevait à 95 % en 2025. Ce chiffre est identique à celui de 2019 (95 %) et à celui de 2024 (95 %).
- Le pourcentage d'enfants n'ayant reçu aucune dose était supérieur de 42 points de pourcentage à l'objectif fixé par l'IA2030 en 2025. On comptait environ 35,000 enfants n'ayant reçu aucune dose en 2025, soit plus que les 34,000 enregistrés en 2019 et plus que les 35,000 recensés en 2024.
- Le taux de couverture vaccinale contre DTC1 à Burkina Faso (95 %) était supérieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 81 % en 2025.
- Le taux d'abandon scolaire entre DTC1 et DTC3 pour l'année 2025 s'élevait à 4 %, soit comme en 2019. Les faibles taux d'abandon de la DTC témoignent d'une bonne capacité à administrer une série complète de vaccins dès le plus jeune âge.

DTC1 : taux de couverture vaccinale et nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose au fil du temps, Burkina Faso, 2000–2025




La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

DTC3 : Un marqueur de la prestation des services de vaccination de routine aux enfants

- Le taux de couverture vaccinale de DTC3 s'élevait à 91 % en 2025. Ce chiffre est identique à celui de 2019 (91 %) et à celui de 2024 (91 %).
- Le nombre d'enfants vaccinés avec le DTC3 est passé de 624,000 en 2019 à 646,000 en 2025.
- En 2025, 64,000 enfants n'étaient pas vaccinés ou l'étaient de manière insuffisante dans Burkina Faso.
- En 2025, 4 % des enfants ayant reçu le DTC1 n'ont pas reçu le DTC3. Ce taux d'abandon de 4 % était identique à celui de 2019 (4 %) et identique au taux d'abandon de 2024 (4 %).
- Le taux de couverture vaccinale contre DTC3 à Burkina Faso (91 %) était supérieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 71 % en 2025.

DTC3 : couverture vaccinale et enfants non vaccinés ou sous-vaccinés au fil du temps, Burkina Faso, 2000–2025




La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

VAR : Le canari dans la mine de charbon

- Le taux de couverture vaccinale de VAR1 s'élevait à 88 % en 2025. Ce chiffre est identique à celui de 2019 (88 %) et à celui de 2024 (88 %).
- Couverture vaccinale pour la deuxième dose du vaccin contre la rougeole (VAR2) est passé de 71 % en 2019 à 65 % en 2025. Cela signifie que 85,000 enfants ne bénéficient toujours d'aucune protection contre la rougeole et que 151,000 autres ne bénéficient que d'une protection partielle.
- En 2025, 7 % des enfants ayant reçu le DTC1 n'ont pas reçu le VAR1. Ce taux d'abandon de 7 % était identique à celui de 2019 (7 %) et identique au taux d'abandon de 2024 (7 %).
- Burkina Faso a atteint une couverture de VAR1 supérieure à 80 % au cours des 3 dernières années.
- Le taux de couverture vaccinale contre VAR1 à Burkina Faso (88 %) était supérieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 64 % en 2025.


VAR couverture vaccinale et VAR nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose au fil du temps, Burkina Faso, 2000–2025



La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

HPV

- La couverture du programme concernant le HPV1 chez les femmes a diminué, passant de 99 % à 95 % entre 2024 et 2025, et la couverture de la dernière dose (HPVc) a également diminué, passant de 99 % à 95 %.
- La couverture HPVc a dépassé l'objectif de 90 % de l'IA2030.
- En 2025, environ 15,000 de femmes à Burkina Faso n'avaient reçu aucun vaccin contre le HPV (non vaccinées).
- Parmi les pays comparables de la région Afrique de l'Ouest et du Centre, Burkina Faso s'est classé 3e sur 15 pays en matière de couverture vaccinale contre le HPVc en 2025.




Comparaison régionale

Le graphique ci-dessous montre comment Burkina Faso se situe par rapport aux autres pays de la région Afrique de l'Ouest et du Centre en ce qui concerne la couverture vaccinale contre le DTC1, DTC3, VAR1 et HPVc en 2025. La ligne pointillée représente la moyenne régionale pour chaque vaccin.

Comparaison de la couverture : Burkina Faso par rapport aux pays comparables de la WCAR, 2025

Ligne pointillée = moyenne régionale



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Vaccins additionnels

- Le taux de couverture du BCG s'élevait à 98 % en 2025. Ce chiffre est identique à celui de 2019 (98 %) et à celui de 2024 (98 %).
- Le taux de couverture du HepB3 s'élevait à 91 % en 2025. Ce chiffre est identique à celui de 2019 (91 %) et à celui de 2024 (91 %).
- Le taux de couverture du Hib3 s'élevait à 91 % en 2025. Ce chiffre est identique à celui de 2019 (91 %) et à celui de 2024 (91 %).
- Le taux de couverture du VPI1 s'élevait à 91 % en 2025. Ce chiffre est identique à celui de 2019 (91 %) et à celui de 2024 (91 %).
- Le taux de couverture du PCVC s'élevait à 91 % en 2025. Ce chiffre est identique à celui de 2019 (91 %) et à celui de 2024 (91 %).
- Le taux de couverture du RotaC s'élevait à 86 % en 2025. Ce chiffre est inférieur à celui de 2019 (91 %) et à celui de 2024 (87 %).

Couverture vaccinale supplémentaire (%), Burkina Faso, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	81	80	90	83	99	99	99	99	99	99	99	99	97	96	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
HepB3							76	89	93	92	91	91	90	88	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Hib3							76	89	93	92	91	91	90	88	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
PCVC															91	91	91	91	91	91	91	66	91	91	91	91
RotaC														9	91	91	91	91	91	91	88	91	82	83	87	86
VPI1																				45	91	91	91	91	91	91



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Annexe

Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC)

Chaque année, l'OMS et l'UNICEF examinent les données nationales sur la vaccination des États membres, y compris la couverture administrative et officielle, les estimations des enquêtes et les informations contextuelles, et utilisent une approche de triangulation des données basée sur des règles pour évaluer la couverture. Les estimations sont produites de manière indépendante, sans emprunter de données à d'autres pays, et ne sont pas basées sur des ajustements ad hoc. Dans certains cas, elles reposent sur une source unique, généralement la couverture déclarée au niveau national. Lorsque les données pour une année pays-vaccin spécifique ne sont pas disponibles, les valeurs des années adjacentes sont interpolées ou extrapolées, et les sources contradictoires sont évaluées pour déterminer l'estimation la plus fiable, en tenant compte des biais potentiels et des avis d'experts.

Méthodes:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Ces points clés présentent les dernières estimations du WUENIC (publiées le 15 juillet 2026).

Définitions des termes de vaccination :

- Bacillus Calmette-Guérin (BCG) : vaccin contre la tuberculose
- Dose de naissance contre l'hépatite B, administrée dans les 24 heures suivant la naissance (HepBB)
- Vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, première dose (DTC1) et troisième dose (DTC3)
- Vaccin contre l'hépatite B, troisième dose (HepB3)
- Vaccin contre l'Haemophilus influenzae de type b, troisième dose (Hib3)
- Vaccin antipoliomyélitique inactivé, première dose (VPI1) et dernière dose (VPIc)
- Vaccins contenant la valence rougeole, première dose (VAR1) et seconde dose (VAR2)
- Vaccin contre le rotavirus, dernière dose (RotaC)
- Vaccin pneumococcique, dernière dose (PCV)
- Vaccin contre la fièvre jaune (YFV)
- Vaccin contre le méningocoque A (MengA)
- Vaccin contre le virus du papillome humain, première dose (HPV1) et dernière dose (HPVc)

Ressources additionnelles : <https://data.unicef.org/resources/immunization/>