

Puntos de discusión de WUENIC: Bolivia

Año de revisión: 2025

Índice

Resumen	2
DTP1: Llegar a los niños con dosis cero	3
DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños	4
MCV: El canario en la mina de carbón	5
VPH	6
Comparación regional	7
Vacunas adicionales	8
Apéndice	9

Bolivia en la región «Americas»




Resumen

- Ninguna de las 13 vacunas infantiles objeto de seguimiento en Bolivia alcanzó una cobertura del 90 % o superior en 2025.
- Cobertura de la primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP1) fue igual en 2025 que en 2024 (65 %), cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra DTP (DTP3) fue igual en 2025 que en 2024 (59 %), y cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV1) fue igual en 2025 que en 2024 (67 %) en 2025.
- En 2025, el número de niños sin ninguna dosis de DTP en Bolivia (89,000) fue de aproximadamente 156 % superior al número anual propuesto para alcanzar el objetivo IA2030 de reducir a la mitad el número de niños sin ninguna dosis de la vacuna DTP para 2030 (35,000), según una trayectoria lineal de descenso.


Cobertura vacunal (%), Bolivia, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
BCG	92	90	93	96	86	88	87	87	90	93	98	99	99	91	92	99	96	93	90	80	82	78	76	74	68	68	
DTP1	92	91	94	96	88	93	87	85	96	97	97	98	97	86	92	97	93	91	89	81	79	75	75	72	65	65	
DTP3	75	71	77	88	84	85	83	84	88	93	91	95	93	86	85	89	87	84	83	75	68	70	69	67	59	59	
Hib3	77	77	77	80	84	85	83	84	88	93	91	95	93	87	85	89	87	84	83	75	68	70	69	67	59	59	
HepB3	77	77	77	80	84	85	83	84	88	93	91	95	93	87	85	89	87	84	83	75	68	70	69	67	59	59	
PCVC															56	86	87	83	83	75	68	70	69	68	59	59	
RotaC									51	76	87	91	91	84	85	89	87	84	87	78	74	71	71	70	62	62	
VPI1																	93	91	89	81	79	75	75	72	68	68	
VPIC																						71	72	67	59	59	
MCV1	84	88	91	96	90	89	88	86	92	93	88	96	92	87	89	95	94	83	89	79	74	75	69	68	67	67	
RCV1	84	88	91	96	90	89	88	86	92	93	88	96	92	87	89	95	94	83	89	79	74	75	69	68	67	67	
MCV2																				38	44	46	56	49	50	61	61
YFV				23	84	87	93	88	72	74	92	90	83	73	88	89	82	84	77	72	71	67	67	66	66	66	



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Número estimado de niños sin ninguna dosis, 2000–2025 y objetivo para 2030, Bolivia




Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.
 Nota: La Agenda de Inmunización 2030 (IA2030) insta a todos los países a reducir a la mitad, de aquí a 2030, el número de niños sin ninguna dosis registrado en 2019. Las barras de color azul oscuro representan el número estimado de niños sin ninguna dosis en el periodo 2000–2025, mientras que la barra de color azul claro representa el número objetivo de niños sin ninguna dosis para 2030. La línea y los puntos muestran el progreso anual y la trayectoria para alcanzar el objetivo en 2030, basándose en una disminución lineal.

DTP1: Llegar a los niños con dosis cero

- La cobertura de DTP1 se situó en el 65 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (81 %) e igual a la de 2024 (65 %).
- El porcentaje de niños que no habían recibido ninguna dosis fue 156 puntos porcentuales superior al objetivo de IA2030 en 2025. En 2025 había aproximadamente 89,000 niños sin vacunar, más que los 48,000 de 2019 y más que los 89,000 de 2024.
- La cobertura de DTP1 en Bolivia (65 %) fue inferior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 89 % en 2025.
- La tasa de abandono de DTP1 a DTP3 en 2025 fue del 9 %, 2 puntos porcentuales más que en 2019 (7%). Las tasas de abandono medias de DTP indican una capacidad moderada para administrar una serie completa de vacunas en las primeras etapas de la vida.

DTP1 cobertura y niños sin ninguna dosis a lo largo del tiempo, Bolivia, 2000–2025




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños

- La cobertura de DTP3 se situó en el 59 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (75 %) e igual a la de 2024 (59 %).
- El número de niños vacunados con DTP3 disminuyó de 189,000 en 2019 a 150,000 en 2025.
- En 2025, había 104,000 niños sin vacunar o con vacunación incompleta en Bolivia.
- En 2025, el 9 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la DTP3. Esta tasa de abandono del 9 % fue 2 puntos porcentuales superior a la de 2019 (7 %) e igual a la tasa de abandono de 2024 (9 %).
- La cobertura de DTP3 en Bolivia (59 %) fue inferior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 83 % en 2025.


DTP3 cobertura y niños sin vacunar o con vacunación incompleta a lo largo del tiempo, Bolivia, 2000–2025



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

MCV: El canario en la mina de carbón

- La cobertura de MCV1 se situó en el 67 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (79 %) e igual a la de 2024 (67 %).
- Cobertura de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV2) aumentó del 44 % en 2019 al 61 % en 2025. Esto deja a 84,000 niños sin ninguna protección contra el sarampión y a otros 14,000 con una protección solo parcial.
- En 2025, el -3 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la MCV1. Esta tasa de abandono del -3 % fue 5 puntos porcentuales inferior a la de 2019 (2 %) e igual a la tasa de abandono de 2024 (-3 %).
- Bolivia ha tenido una cobertura del MCV1 inferior al 80 % durante los últimos 3 años.
- La cobertura de MCV1 en Bolivia (67 %) fue inferior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 86 % en 2025.



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

VPH


- Bolivia había introducido la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) a partir de 2025, pero no dispone de datos de WUENIC sobre VPH a fecha de 2025.

Comparación regional

El gráfico siguiente muestra cómo se sitúa Bolivia en comparación con otros países de la región América Latina y el Caribe en cuanto a la cobertura de DTP1, DTP3 y MCV1 en 2025. La línea discontinua representa la media regional para cada vacuna.

Comparación de cobertura: Bolivia frente a los países comparables de LACR, 2025

Línea discontinua = promedio regional



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Vacunas adicionales

- La cobertura de BCG se situó en el 68 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (80 %) e igual a la de 2024 (68 %).
- La cobertura de HepB3 se situó en el 59 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (75 %) e igual a la de 2024 (59 %).
- La cobertura de Hib3 se situó en el 59 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (75 %) e igual a la de 2024 (59 %).
- La cobertura de VPI1 se situó en el 68 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (81 %) e igual a la de 2024 (68 %).
- La cobertura de PCVC se situó en el 59 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (75 %) e igual a la de 2024 (59 %).
- La cobertura de RotaC se situó en el 62 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (78 %) e igual a la de 2024 (62 %).

Cobertura adicional de vacunación (%), Bolivia, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	92	90	93	96	86	88	87	87	90	93	98	99	99	91	92	99	96	93	90	80	82	78	76	74	68	68
HepB3	77	77	77	80	84	85	83	84	88	93	91	95	93	87	85	89	87	84	83	75	68	70	69	67	59	59
Hib3	77	77	77	80	84	85	83	84	88	93	91	95	93	87	85	89	87	84	83	75	68	70	69	67	59	59
PCVC															56	86	87	83	83	75	68	70	69	68	59	59
RotaC									51	76	87	91	91	84	85	89	87	84	87	78	74	71	71	70	62	62
VPI1																	93	91	89	81	79	75	75	72	68	68



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Apéndice

Estimaciones de la OMS y el UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación (WUENIC)

Cada año, la OMS y el UNICEF revisan los datos nacionales de inmunización de los Estados Miembros, incluida la cobertura administrativa y oficial, las estimaciones de las encuestas y la información contextual, y utilizan un enfoque de triangulación de datos basado en reglas para evaluar la cobertura. Las estimaciones se producen de forma independiente, sin tomar datos prestados de otros países, y no se basan en ajustes ad hoc. En algunos casos, se basan en una sola fuente, normalmente la cobertura notificada a nivel nacional. Cuando no se dispone de datos para un año-vacuna-país específico, los valores de los años adyacentes se interpolan o extrapolan, y se evalúan las fuentes en conflicto para determinar la estimación más fiable, teniendo en cuenta los posibles sesgos y la opinión de expertos.

Métodos:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Estos puntos clave presentan las últimas estimaciones de la WUENIC (publicadas el 15 de julio de 2026).

Definiciones de términos de inmunización:

- Bacilo de Calmette-Guérin (BCG): vacuna contra la tuberculosis
- Dosis de nacimiento contra la hepatitis B, administrada dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento (HepBB)
- Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, primera dosis (DTP1) y tercera dosis (DTP3)
- Vacuna contra la hepatitis B, tercera dosis (HepB3)
- Vacuna contra *Haemophilus influenzae* tipo B, tercera dosis (Hib3)
- Vacuna inactivada contra la polio, primera dosis (IPV1) y última dosis (IPVC)
- Vacuna que contiene sarampión, primera dosis (MCV1) y segunda dosis (MCV2)
- Vacuna contra el rotavirus, última dosis (RotaC)
- Vacuna neumocócica, última dosis (PCV)
- Vacuna contra la fiebre amarilla (YFV)
- Vacuna contra el meningococo A (MengA)
- Vacuna contra el virus del papiloma humano, primera dosis (VPH1) y última dosis (VPHc)

Recursos adicionales: <https://data.unicef.org/resources/immunization/>