

# Puntos de discusión de WUENIC: Chile

Año de revisión: 2025

## Índice

|                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Resumen . . . . .                                                                                 | 2 |
| DTP1: Llegar a los niños con dosis cero . . . . .                                                 | 3 |
| DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños . . . . . | 4 |
| MCV: El canario en la mina de carbón . . . . .                                                    | 5 |
| VPH . . . . .                                                                                     | 6 |
| Comparación regional . . . . .                                                                    | 7 |
| Vacunas adicionales . . . . .                                                                     | 8 |
| Apéndice . . . . .                                                                                | 9 |

### Chile en la región «Americas»




## Resumen

- En Chile se realiza un seguimiento de un total de 12 vacunas infantiles; de ellas, 11 alcanzaron el objetivo de cobertura del 90 % o más en 2025.
- Cobertura de la primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP1) fue igual en 2025 que en 2024 (98 %), cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra DTP (DTP3) fue igual en 2025 que en 2024 (95 %), y cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV1) aumentó del 93 % en 2024 al 95 % en 2025.
- En 2025, el número de niños sin ninguna dosis de DTP en Chile (3,000) fue de aproximadamente el 123 % superior al número anual propuesto para alcanzar el objetivo IA2030 de reducir a la mitad el número de niños sin ninguna dosis de la vacuna DTP para 2030 (2,000), según una trayectoria lineal de descenso.


### Cobertura vacunal (%), Chile, 2000–2025

|       | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |    |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| BCG   | 93   | 98   | 96   | 95   | 95   | 95   | 98   | 98   | 99   | 95   | 95   | 91   | 92   | 98   | 98   | 93   | 97   | 96   | 96   | 98   | 98   | 99   | 98   | 99   | 99   | 99   |    |
| HepBB |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 65   | 99   | 98   | 99   | 99   | 98   | 99   |    |
| DTP1  | 98   | 99   | 98   | 98   | 94   | 92   | 95   | 98   | 96   | 94   | 93   | 94   | 90   | 92   | 99   | 97   | 99   | 98   | 99   | 99   | 98   | 99   | 99   | 99   | 98   | 98   |    |
| DTP3  | 91   | 97   | 97   | 96   | 93   | 91   | 94   | 96   | 95   | 94   | 92   | 94   | 90   | 91   | 95   | 96   | 95   | 93   | 95   | 96   | 93   | 95   | 96   | 96   | 95   | 95   |    |
| Hib3  | 91   | 97   | 97   | 96   | 93   | 91   | 94   | 96   | 95   | 94   | 92   | 94   | 90   | 90   | 95   | 96   | 95   | 93   | 95   | 96   | 93   | 95   | 96   | 96   | 95   | 95   |    |
| HepB3 |      |      |      |      |      |      | 95   | 92   | 95   | 94   | 92   | 94   | 90   | 90   | 95   | 96   | 95   | 93   | 95   | 96   | 93   | 95   | 96   | 96   | 95   | 95   |    |
| PCVC  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 54   | 82   | 79   | 92   | 90   | 93   | 93   | 93   | 95   | 89   | 92   | 93   | 93   | 93   | 94   |    |
| VPI1  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 99   | 98   | 98   | 99   | 98   | 99   | 99   | 99   | 98   | 98   |    |
| VPIC  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 95   | 96   | 96   | 95   | 95   |    |
| MCV1  | 97   | 96   | 95   | 96   | 94   | 90   | 91   | 92   | 96   | 93   | 93   | 91   | 90   | 90   | 97   | 96   | 93   | 93   | 93   | 95   | 91   | 92   | 94   | 94   | 93   | 95   |    |
| RCV1  | 97   | 96   | 95   | 96   | 94   | 90   | 91   | 92   | 96   | 93   | 93   | 91   | 90   | 90   | 97   | 96   | 93   | 93   | 93   | 95   | 91   | 92   | 94   | 94   | 93   | 95   |    |
| MCV2  |      |      |      |      | 96   | 96   | 95   | 95   | 89   | 89   | 84   | 77   | 74   | 78   | 88   | 89   | 87   | 90   | 93   | 91   | 83   | 91   | 81   | 70   | 73   | 78   |    |
| VPHc  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 76   | 79   | 72   | 78   | 84   | 76   | 59   | 69   | 82   | 87   | 92 |



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.


### Número estimado de niños sin ninguna dosis, 2000–2025 y objetivo para 2030, Chile



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.  
 Nota: La Agenda de Inmunización 2030 (IA2030) insta a todos los países a reducir a la mitad, de aquí a 2030, el número de niños sin ninguna dosis registrado en 2019. Las barras de color azul oscuro representan el número estimado de niños sin ninguna dosis en el periodo 2000–2025, mientras que la barra de color azul claro representa el número objetivo de niños sin ninguna dosis para 2030. La línea y los puntos muestran el progreso anual y la trayectoria para alcanzar el objetivo en 2030, basándose en una disminución lineal.

## DTP1: Llegar a los niños con dosis cero

- La cobertura de DTP1 se situó en el 98 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (99 %) e igual a la de 2024 (98 %).
- El porcentaje de niños que no habían recibido ninguna dosis fue 123 puntos porcentuales superior al objetivo de IA2030 en 2025. En 2025 había aproximadamente 3,000 niños que no habían recibido ninguna dosis, más que los 2,000 de 2019, pero menos que los 3,000 de 2024.
- La cobertura de DTP1 en Chile (98 %) fue superior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 89 % en 2025.
- La tasa de abandono de DTP1 a DTP3 en 2025 fue del 3 %, igual que en 2019. Las bajas tasas de abandono de DTP indican una buena capacidad para administrar una serie completa de vacunas en las primeras etapas de la vida.




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%  
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

## DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños

- La cobertura de DTP3 se situó en el 95 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (96 %) e igual a la de 2024 (95 %).
- El número de niños vacunados con DTP3 disminuyó de 201,000 en 2019 a 161,000 en 2025.
- En 2025, había 8,000 niños sin vacunar o con vacunación incompleta en Chile.
- En 2025, el 3 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la DTP3. Esta tasa de abandono del 3 % fue la misma que en 2019 (3 %) y la misma que la tasa de abandono de 2024 (3 %).
- La cobertura de DTP3 en Chile (95 %) fue superior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 83 % en 2025.


**DTP3 cobertura y niños sin vacunar o con vacunación incompleta a lo largo del tiempo, Chile, 2000–2025**



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%  
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

## MCV: El canario en la mina de carbón


- La cobertura de MCV1 se situó en el 95 % en 2025. Este porcentaje es el mismo que en 2019 (95 %) y superior al de 2024 (93 %).
- Cobertura de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV2) disminuyó del 91 % en 2019 al 78 % en 2025. Esto sigue dejando a 8,000 niños sin ninguna protección contra el sarampión y a otros 32,000 con una protección solo parcial.
- En 2025, el 3 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la MCV1. Esta tasa de abandono del 3 % fue 1 puntos porcentuales inferior a la de 2019 (4 %) y 2 puntos porcentuales inferior a la tasa de abandono de 2024 (5 %).
- Chile ha alcanzado una cobertura de MCV1 superior al 80 % durante los últimos 3 años.
- La cobertura de MCV1 en Chile (95 %) fue superior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 86 % en 2025.



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%  
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

## VPH

- La cobertura del programa de VPH1 entre las mujeres aumentó del 91 % al 92 % entre 2024 y 2025, y la cobertura de la última dosis (VPHc) también aumentó del 87 % al 92 %.
- La cobertura de VPHc ha superado el objetivo del 90% de la IA2030.
- En 2025, aproximadamente 10,000 mujeres de Chile no recibieron ninguna vacuna contra el VPH (no vacunadas).
- Entre los países comparables de la región América Latina y el Caribe, Chile ocupó el puesto 2 de un total de 31 países en cuanto a la cobertura de VPHc en el año 2025.




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%  
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

## Comparación regional

El gráfico siguiente muestra cómo se sitúa Chile en comparación con otros países de la región América Latina y el Caribe en cuanto a la cobertura de DTP1, DTP3, MCV1 y VPHc en 2025. La línea discontinua representa la media regional para cada vacuna.

### Comparación de cobertura: Chile frente a los países comparables de LACR, 2025

Línea discontinua = promedio regional



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

## Vacunas adicionales

- La cobertura de BCG se situó en el 99 % en 2025. Esta cifra es superior a la de 2019 (98 %) e igual a la de 2024 (99 %).
- La cobertura de HepB3 se situó en el 95 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (96 %) e igual a la de 2024 (95 %).
- La cobertura de Hib3 se situó en el 95 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (96 %) e igual a la de 2024 (95 %).
- La cobertura de VPI1 se situó en el 98 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (99 %) e igual a la de 2024 (98 %).
- La cobertura de PCVC se situó en el 94 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (95 %), pero superior a la de 2024 (93 %).

### Cobertura adicional de vacunación (%), Chile, 2000–2025

|       | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BCG   | 93   | 98   | 96   | 95   | 95   | 95   | 98   | 98   | 99   | 95   | 95   | 91   | 92   | 98   | 98   | 93   | 97   | 96   | 96   | 98   | 98   | 98   | 99   | 98   | 99   | 99   |
| HepB3 |      |      |      |      |      |      | 95   | 92   | 95   | 94   | 92   | 94   | 90   | 90   | 95   | 96   | 95   | 93   | 95   | 96   | 93   | 95   | 96   | 96   | 95   | 95   |
| Hib3  | 91   | 97   | 97   | 96   | 93   | 91   | 94   | 96   | 95   | 94   | 92   | 94   | 90   | 90   | 95   | 96   | 95   | 93   | 95   | 96   | 93   | 95   | 96   | 96   | 95   | 95   |
| PCVC  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 54   | 82   | 79   | 92   | 90   | 93   | 93   | 93   | 95   | 89   | 92   | 93   | 93   | 93   | 94   |
| VPI1  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 99   | 98   | 98   | 99   | 98   | 99   | 99   | 99   | 98   | 98   |



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

## Apéndice

### Estimaciones de la OMS y el UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación (WUENIC)

Cada año, la OMS y el UNICEF revisan los datos nacionales de inmunización de los Estados Miembros, incluida la cobertura administrativa y oficial, las estimaciones de las encuestas y la información contextual, y utilizan un enfoque de triangulación de datos basado en reglas para evaluar la cobertura. Las estimaciones se producen de forma independiente, sin tomar datos prestados de otros países, y no se basan en ajustes ad hoc. En algunos casos, se basan en una sola fuente, normalmente la cobertura notificada a nivel nacional. Cuando no se dispone de datos para un año-vacuna-país específico, los valores de los años adyacentes se interpolan o extrapolan, y se evalúan las fuentes en conflicto para determinar la estimación más fiable, teniendo en cuenta los posibles sesgos y la opinión de expertos.

Métodos:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Estos puntos clave presentan las últimas estimaciones de la WUENIC (publicadas el 15 de julio de 2026).

### Definiciones de términos de inmunización:

- Bacilo de Calmette-Guérin (BCG): vacuna contra la tuberculosis
- Dosis de nacimiento contra la hepatitis B, administrada dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento (HepBB)
- Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, primera dosis (DTP1) y tercera dosis (DTP3)
- Vacuna contra la hepatitis B, tercera dosis (HepB3)
- Vacuna contra *Haemophilus influenzae* tipo B, tercera dosis (Hib3)
- Vacuna inactivada contra la polio, primera dosis (IPV1) y última dosis (IPVC)
- Vacuna que contiene sarampión, primera dosis (MCV1) y segunda dosis (MCV2)
- Vacuna contra el rotavirus, última dosis (RotaC)
- Vacuna neumocócica, última dosis (PCV)
- Vacuna contra la fiebre amarilla (YFV)
- Vacuna contra el meningococo A (MengA)
- Vacuna contra el virus del papiloma humano, primera dosis (VPH1) y última dosis (VPHc)

Recursos adicionales: <https://data.unicef.org/resources/immunization/>