

Puntos de discusión de WUENIC: Colombia 🇨🇴

Año de revisión: 2025

Índice

Resumen	2
DTP1: Llegar a los niños con dosis cero	4
DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños	5
MCV: El canario en la mina de carbón	6
VPH	7
Comparación regional	8
Vacunas adicionales	9
Apéndice	10

Colombia en la región «Américas»



Resumen


- En Colombia se realiza un seguimiento de un total de 14 vacunas infantiles; de ellas, 11 alcanzaron el objetivo de cobertura del 90 % o superior en 2025.
- Cobertura de la primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP1) aumentó del 89 % en 2024 al 94 % en 2025, cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra DTP (DTP3) aumentó del 89 % en 2024 al 92 % en 2025, y cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV1) descendió del 93 % en 2024 al 91 % en 2025 en 2025.
- En 2025, el número de niños sin ninguna dosis de DTP en Colombia (41,000) fue de aproximadamente el 61 % superior al número anual propuesto para alcanzar el objetivo IA2030 de reducir a la mitad el número de niños sin ninguna dosis de la vacuna DTP para 2030 (26,000), según una trayectoria lineal de descenso.

Cobertura vacunal (%), Colombia, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	91	87	87	97	92	94	96	93	93	90	84	87	89	85	89	90	88	91	89	90	89	87	87	87	85	94
HepBB																		81	77	81	88	87	85	77	76	86
DTP1	91	82	93	94	90	97	98	97	97	97	96	95	92	97	91	93	93	94	92	95	92	91	91	90	89	94
DTP3	79	80	81	92	89	93	93	94	92	92	88	85	92	91	90	91	91	92	92	94	88	87	87	90	89	92
Hib3	65	55	69	93	89	93	93	94	92	92	88	85	92	91	90	91	91	92	92	92	88	87	87	90	89	92
HepB3	78	80	78	92	89	93	93	94	92	92	88	85	92	91	90	91	91	92	92	92	88	87	87	90	89	92
PCVC											22	46	84	87	89	91	89	91	94	93	89	84	85	90	91	89
RotaC										55	74	78	87	87	89	91	90	90	92	95	87	86	85	86	86	91
VPI1																92	91	92	93	95	92	90	89	90	88	94
VPIC																						86	86	90	88	92
MCV1	88	93	93	93	92	94	95	95	92	95	88	88	94	92	91	94	93	93	95	95	90	86	88	93	93	91
RCV1	88	93	93	93	92	94	95	95	92	95	88	88	94	92	91	94	93	93	95	95	90	86	88	93	93	91
MCV2	84	83	93	70	70	73	85	93	70	71	74	76	80	72	88	86	87	89	88	89	88	86	84	84	86	86
YFV							88	84	81	80	79	88	92	92	92	85	77	88	87	90	84	86	75	86	90	96
VPHc													86	48	17	7	2	3	9	10	10	11	11	53	59	57



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.




Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.
 Nota: La Agenda de Inmunización 2030 (IA2030) insta a todos los países a reducir a la mitad, para 2030, el número de niños sin ninguna dosis registrado en 2019.
 Las barras de color azul oscuro representan el número estimado de niños sin ninguna dosis en el período 2000–2025, mientras que la barra de color azul claro representa el número objetivo de niños sin ninguna dosis para 2030.
 La línea y los puntos muestran el progreso anual y la trayectoria para alcanzar el objetivo en 2030, basándose en una disminución lineal.

DTP1: Llegar a los niños con dosis cero

- La cobertura de DTP1 se situó en el 94 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (95 %) y superior a la de 2024 (89 %).
- El porcentaje de niños que no habían recibido ninguna dosis fue 61 puntos porcentuales superior al objetivo de IA2030 en 2025. En 2025 había aproximadamente 41,000 niños que no habían recibido ninguna dosis, más que los 35,000 de 2019, pero menos que los 76,000 de 2024.
- La cobertura de DTP1 en Colombia (94 %) fue superior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 89 % en 2025.
- La tasa de abandono de DTP1 a DTP3 en 2025 fue del 2 %, 1 puntos porcentuales más que en 2019 (1%). Las bajas tasas de abandono de DTP indican una buena capacidad para administrar una serie completa de vacunas en las primeras etapas de la vida.

DTP1 cobertura y niños sin ninguna dosis a lo largo del tiempo, Colombia, 2000–2025




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños

- La cobertura de DTP3 se situó en el 92 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (94 %) y superior a la de 2024 (89 %).
- El número de niños vacunados con DTP3 disminuyó de 660,000 en 2019 a 632,000 en 2025.
- En 2025, había 55,000 niños sin vacunar o con vacunación incompleta en Colombia.
- En 2025, el 2 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la DTP3. Esta tasa de abandono del 2 % fue 1 puntos porcentuales superior a la de 2019 (1 %) y 2 puntos porcentuales superior a la tasa de abandono de 2024 (0 %).
- La cobertura de DTP3 en Colombia (92 %) fue superior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 83 % en 2025.


DTP3 cobertura y niños sin vacunar o con vacunación incompleta a lo largo del tiempo, Colombia, 2000–2025



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

MCV: El canario en la mina de carbón


- La cobertura de MCV1 se situó en el 91 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (95 %) y a la de 2024 (93 %).
- Cobertura de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV2) disminuyó del 89 % en 2019 al 86 % en 2025. Esto deja a 62,000 niños sin ninguna protección contra el sarampión y a otros 39,000 con una protección solo parcial.
- En 2025, el 3 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la MCV1. Esta tasa de abandono del 3 % fue 3 puntos porcentuales superior a la de 2019 (0 %) y 7 puntos porcentuales superior a la tasa de abandono de 2024 (-4 %).
- Colombia ha alcanzado una cobertura de MCV1 superior al 80 % durante los últimos 3 años.
- La cobertura de MCV1 en Colombia (91 %) fue superior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 86 % en 2025.



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

VPH

- La cobertura del programa de VPH1 entre las mujeres disminuyó del 59 % al 57 % entre 2024 y 2025, y la cobertura de la última dosis (VPHc) también disminuyó del 59 % al 57 %.
- La cobertura de VPHc sigue estando muy por debajo del objetivo del 90% de la IA2030.
- En 2025, aproximadamente 159,000 mujeres de Colombia no recibieron ninguna vacuna contra el VPH (no vacunadas).
- Entre los países comparables de la región América Latina y el Caribe, Colombia ocupó el puesto 21 de un total de 31 países en cuanto a la cobertura de VPHc en el año 2025.




Comparación regional

El gráfico siguiente muestra cómo se sitúa Colombia en comparación con otros países de la región América Latina y el Caribe en cuanto a la cobertura de DTP1, DTP3, MCV1 y VPHc en 2025. La línea discontinua representa la media regional para cada vacuna.

Comparación de cobertura: Colombia frente a los países comparables de LACR, 2025

Línea discontinua = promedio regional



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Vacunas adicionales

- La cobertura de BCG se situó en el 94 % en 2025. Esta cifra es superior a la de 2019 (90 %) y a la de 2024 (85 %).
- La cobertura de HepB3 se situó en el 92 % en 2025. Este dato es igual al de 2019 (92 %), pero superior al de 2024 (89 %).
- La cobertura de Hib3 se situó en el 92 % en 2025. Este dato es igual al de 2019 (92 %), pero superior al de 2024 (89 %).
- La cobertura de VPI1 se situó en el 94 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (95 %), pero superior a la de 2024 (88 %).
- La cobertura de PCVC se situó en el 89 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (93 %) y a la de 2024 (91 %).
- La cobertura de RotaC se situó en el 91 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (95 %), pero superior a la de 2024 (86 %).

Cobertura adicional de vacunación (%), Colombia, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	91	87	87	97	92	94	96	93	93	90	84	87	89	85	89	90	88	91	89	90	89	87	87	87	85	94
HepB3	78	80	78	92	89	93	93	94	92	92	88	85	92	91	90	91	91	92	92	92	88	87	87	90	89	92
Hib3	65	55	69	93	89	93	93	94	92	92	88	85	92	91	90	91	91	92	92	92	88	87	87	90	89	92
PCVC											22	46	84	87	89	91	89	91	94	93	89	84	85	90	91	89
RotaC										55	74	78	87	87	89	91	90	90	92	95	87	86	85	86	86	91
VPI1																92	91	92	93	95	92	90	89	90	88	94



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Apéndice

Estimaciones de la OMS y el UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación (WUENIC)

Cada año, la OMS y el UNICEF revisan los datos nacionales de inmunización de los Estados Miembros, incluida la cobertura administrativa y oficial, las estimaciones de las encuestas y la información contextual, y utilizan un enfoque de triangulación de datos basado en reglas para evaluar la cobertura. Las estimaciones se producen de forma independiente, sin tomar datos prestados de otros países, y no se basan en ajustes ad hoc. En algunos casos, se basan en una sola fuente, normalmente la cobertura notificada a nivel nacional. Cuando no se dispone de datos para un año-vacuna-país específico, los valores de los años adyacentes se interpolan o extrapolan, y se evalúan las fuentes en conflicto para determinar la estimación más fiable, teniendo en cuenta los posibles sesgos y la opinión de expertos.

Métodos:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Estos puntos clave presentan las últimas estimaciones de la WUENIC (publicadas el 15 de julio de 2026).

Definiciones de términos de inmunización:

- Bacilo de Calmette-Guérin (BCG): vacuna contra la tuberculosis
- Dosis de nacimiento contra la hepatitis B, administrada dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento (HepBB)
- Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, primera dosis (DTP1) y tercera dosis (DTP3)
- Vacuna contra la hepatitis B, tercera dosis (HepB3)
- Vacuna contra *Haemophilus influenzae* tipo B, tercera dosis (Hib3)
- Vacuna inactivada contra la polio, primera dosis (IPV1) y última dosis (IPVC)
- Vacuna que contiene sarampión, primera dosis (MCV1) y segunda dosis (MCV2)
- Vacuna contra el rotavirus, última dosis (RotaC)
- Vacuna neumocócica, última dosis (PCV)
- Vacuna contra la fiebre amarilla (YFV)
- Vacuna contra el meningococo A (MengA)
- Vacuna contra el virus del papiloma humano, primera dosis (VPH1) y última dosis (VPHc)

Recursos adicionales: <https://data.unicef.org/resources/immunization/>