

Puntos de discusión de WUENIC: Ecuador

Año de revisión: 2025

Índice

Resumen	2
DTP1: Llegar a los niños con dosis cero	4
DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños	5
MCV: El canario en la mina de carbón	6
VPH	7
Comparación regional	8
Vacunas adicionales	9
Apéndice	10

Ecuador en la región «Americas»



Resumen


- Ninguna de las 14 vacunas infantiles de las que se tiene constancia en Ecuador alcanzó una cobertura del 90 % o superior en 2025.
- Cobertura de la primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP1) descendió del 87 % en 2024 al 80 % en 2025, cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra DTP (DTP3) descendió del 87 % en 2024 al 77 % en 2025, y cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV1) descendió del 87 % en 2024 al 78 % en 2025.
- En 2025, el número de niños sin ninguna dosis de DTP en Ecuador (53,000) fue de aproximadamente el 67 % superior al número anual propuesto para alcanzar el objetivo IA2030 de reducir a la mitad el número de niños sin ninguna dosis de la vacuna DTP para 2030 (32,000), según una trayectoria lineal de descenso.

Cobertura vacunal (%), Ecuador, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	99	99	99	99	99	99	99	99	98	99	98	98	94	90	89	88	84	88	90	86	81	75	76	82	88	73
HepBB													16	69	79	75	68	61	70	71	62	61	63	69	74	63
DTP1	94	95	95	95	95	96	96	98	98	98	91	89	88	87	84	80	83	85	86	85	74	77	74	81	87	80
DTP3	87	89	88	87	88	92	96	96	96	94	91	88	87	87	83	78	83	85	85	85	70	68	70	79	87	77
Hib3				54	86	90	94	95	95	93	90	88	87	87	83	78	83	85	85	85	70	68	70	79	87	77
HepB3	36	69	75	82	88	92	96	94	93	91	90	88	88	87	83	78	83	85	85	85	70	68	70	79	87	77
PCVC											17	71	94	90	86	81	84	84	85	83	76	62	71	79	86	76
RotaC									82	97	94	90	87	83	81	78	80	84	85	85	75	60	73	79	85	76
VPI1																3	79	83	86	85	80	70	75	81	87	79
VPIC																						68	74	81	87	77
MCV1	99	99	99	99	99	93	97	98	98	97	95	94	96	97	85	84	86	81	83	83	81	65	74	81	87	78
RCV1	99	99	99	99	99	93	97	98	98	97	95	94	96	97	85	84	86	81	83	83	81	65	74	81	87	78
MCV2										99	91	92	81	70	59	76	64	73	74	76	70	58	60	67	74	79
YFV	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	81	74	74	73	86	78	81	84	85	84	79	70	70	77	83	79
VPHc															81	99	95	86	72	54	35	2	52	51	89	68



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.




Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.
 Nota: La Agenda de Inmunización 2030 (IA2030) insta a todos los países a reducir a la mitad, de aquí a 2030, el número de niños sin ninguna dosis registrado en 2019.
 Las barras de color azul oscuro representan el número estimado de niños sin ninguna dosis en el período 2000–2025, mientras que la barra de color azul claro representa el número objetivo de niños sin ninguna dosis para 2030.
 La línea y los puntos muestran el progreso anual y la trayectoria para alcanzar el objetivo en 2030, basándose en una disminución lineal.

DTP1: Llegar a los niños con dosis cero

- La cobertura de DTP1 se situó en el 80 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (85 %) y a la de 2024 (87 %).
- El porcentaje de niños que no habían recibido ninguna dosis fue 67 puntos porcentuales superior al objetivo de IA2030 en 2025. En 2025 había aproximadamente 53,000 niños sin dosis, más que los 44,000 de 2019 y más que los 35,000 de 2024.
- La cobertura de DTP1 en Ecuador (80 %) fue inferior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 89 % en 2025.
- La tasa de abandono de DTP1 a DTP3 en 2025 fue del 4 %, 4 puntos porcentuales más que en 2019 (0%). Las bajas tasas de abandono de DTP indican una buena capacidad para administrar una serie completa de vacunas en las primeras etapas de la vida.

DTP1 cobertura y niños sin ninguna dosis a lo largo del tiempo, Ecuador, 2000–2025




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños

- La cobertura de DTP3 se situó en el 77 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (85 %) y a la de 2024 (87 %).
- El número de niños vacunados con DTP3 disminuyó de 247,000 en 2019 a 204,000 en 2025.
- En 2025, había 61,000 niños sin vacunar o con vacunación incompleta en Ecuador.
- En 2025, el 4 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la DTP3. Esta tasa de abandono del 4 % fue 4 puntos porcentuales superior a la de 2019 (0 %) y 4 puntos porcentuales superior a la tasa de abandono de 2024 (0 %).
- La cobertura de DTP3 en Ecuador (77 %) fue inferior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 83 % en 2025.


DTP3 cobertura y niños sin vacunar o con vacunación incompleta a lo largo del tiempo, Ecuador, 2000–2025



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

MCV: El canario en la mina de carbón


- La cobertura de MCV1 se situó en el 78 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (83 %) y a la de 2024 (87 %).
- Cobertura de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV2) aumentó del 76 % en 2019 al 79 % en 2025. Esto deja a 58,000 niños sin ninguna protección contra el sarampión y a otros -2,000 con una protección solo parcial.
- En 2025, el 2 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la MCV1. Esta tasa de abandono del 2 % fue la misma que en 2019 (2 %), pero 2 puntos porcentuales superior a la tasa de abandono de 2024 (0 %).
- Ecuador ha alcanzado una cobertura de MCV1 superior al 80 % durante los últimos 3 años.
- La cobertura de MCV1 en Ecuador (78 %) fue inferior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 86 % en 2025.



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

VPH

- La cobertura del programa de VPH1 entre las mujeres disminuyó del 89 % al 68 % entre 2024 y 2025, y la cobertura de la última dosis (VPHc) también disminuyó del 89 % al 68 %.
- La cobertura de VPHc sigue estando muy por debajo del objetivo del 90% de la IA2030.
- En 2025, aproximadamente 51,000 mujeres de Ecuador no recibieron ninguna vacuna contra el VPH (no vacunadas).
- Entre los países comparables de la región América Latina y el Caribe, Ecuador ocupó el puesto 15 de un total de 31 países en cuanto a la cobertura de VPHc en el año 2025.




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Comparación regional

El gráfico siguiente muestra cómo se sitúa Ecuador en comparación con otros países de la región América Latina y el Caribe en cuanto a la cobertura de DTP1, DTP3, MCV1 y VPHc en 2025. La línea discontinua representa la media regional para cada vacuna.

Comparación de cobertura: Ecuador frente a los países comparables de LACR, 2025

Línea discontinua = promedio regional



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Vacunas adicionales

- La cobertura de BCG se situó en el 73 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (86 %) y a la de 2024 (88 %).
- La cobertura de HepB3 se situó en el 77 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (85 %) y a la de 2024 (87 %).
- La cobertura de Hib3 se situó en el 77 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (85 %) y a la de 2024 (87 %).
- La cobertura de VPI1 se situó en el 79 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (85 %) y a la de 2024 (87 %).
- La cobertura de PCVC se situó en el 76 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (83 %) y a la de 2024 (86 %).
- La cobertura de RotaC se situó en el 76 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (85 %) y a la de 2024 (85 %).

Cobertura adicional de vacunación (%), Ecuador, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	99	99	99	99	99	99	99	99	98	99	98	98	94	90	89	88	84	88	90	86	81	75	76	82	88	73
HepB3	36	69	75	82	88	92	96	94	93	91	90	88	88	87	83	78	83	85	85	85	70	68	70	79	87	77
Hib3				54	86	90	94	95	95	93	90	88	87	87	83	78	83	85	85	85	70	68	70	79	87	77
PCVC											17	71	94	90	86	81	84	84	85	83	76	62	71	79	86	76
RotaC									82	97	94	90	87	83	81	78	80	84	85	85	75	60	73	79	85	76
VPI1																3	79	83	86	85	80	70	75	81	87	79



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Apéndice

Estimaciones de la OMS y el UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación (WUENIC)

Cada año, la OMS y el UNICEF revisan los datos nacionales de inmunización de los Estados Miembros, incluida la cobertura administrativa y oficial, las estimaciones de las encuestas y la información contextual, y utilizan un enfoque de triangulación de datos basado en reglas para evaluar la cobertura. Las estimaciones se producen de forma independiente, sin tomar datos prestados de otros países, y no se basan en ajustes ad hoc. En algunos casos, se basan en una sola fuente, normalmente la cobertura notificada a nivel nacional. Cuando no se dispone de datos para un año-vacuna-país específico, los valores de los años adyacentes se interpolan o extrapolan, y se evalúan las fuentes en conflicto para determinar la estimación más fiable, teniendo en cuenta los posibles sesgos y la opinión de expertos.

Métodos:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Estos puntos clave presentan las últimas estimaciones de la WUENIC (publicadas el 15 de julio de 2026).

Definiciones de términos de inmunización:

- Bacilo de Calmette-Guérin (BCG): vacuna contra la tuberculosis
- Dosis de nacimiento contra la hepatitis B, administrada dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento (HepBB)
- Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, primera dosis (DTP1) y tercera dosis (DTP3)
- Vacuna contra la hepatitis B, tercera dosis (HepB3)
- Vacuna contra *Haemophilus influenzae* tipo B, tercera dosis (Hib3)
- Vacuna inactivada contra la polio, primera dosis (IPV1) y última dosis (IPVC)
- Vacuna que contiene sarampión, primera dosis (MCV1) y segunda dosis (MCV2)
- Vacuna contra el rotavirus, última dosis (RotaC)
- Vacuna neumocócica, última dosis (PCV)
- Vacuna contra la fiebre amarilla (YFV)
- Vacuna contra el meningococo A (MengA)
- Vacuna contra el virus del papiloma humano, primera dosis (VPH1) y última dosis (VPHc)

Recursos adicionales: <https://data.unicef.org/resources/immunization/>