

Puntos de discusión de WUENIC: Guatemala

Año de revisión: 2025

Índice

Resumen	2
DTP1: Llegar a los niños con dosis cero	4
DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños	5
MCV: El canario en la mina de carbón	6
VPH	7
Comparación regional	8
Vacunas adicionales	9
Apéndice	10

Guatemala en la región «Americas»



Resumen


- En Guatemala se realiza un seguimiento de un total de 13 vacunas infantiles; de ellas, 2 alcanzaron el objetivo de cobertura del 90 % o más en 2025.
- Cobertura de la primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP1) descendió del 96 % en 2024 al 86 % en 2025, cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra DTP (DTP3) descendió del 90 % en 2024 al 77 % en 2025, y cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV1) descendió del 91 % en 2024 al 90 % en 2025 en 2025.
- En 2025, el número de niños sin ninguna dosis de DTP en Guatemala (52,000) fue de aproximadamente el 365 % superior al número anual propuesto para alcanzar el objetivo IA2030 de reducir a la mitad el número de niños sin ninguna dosis de la vacuna DTP para 2030 (11,000), según una trayectoria lineal de descenso.

Cobertura vacunal (%), Guatemala, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
BCG	95	93	96	97	98	96	96	88	99	93	99	91	94	99	93	92	91	93	88	90	93	85	87	95	93	88	
HepBB											15	31	35	39	21	32	40	53	48	56	51	47	49	52	48	50	
DTP1	94	93	93	96	98	97	95	88	99	95	96	94	98	98	91	99	99	98	94	96	99	91	94	99	96	86	
DTP3	81	77	82	84	87	87	89	85	95	92	94	88	96	96	74	70	83	91	85	88	90	80	81	88	90	77	
Hib3						87	89	85	95	92	94	88	96	96	74	70	83	91	85	88	90	80	81	88	90	77	
HepB3						87	89	85	95	92	94	88	96	96	74	70	83	91	85	88	90	80	81	88	90	77	
PCVC														72	62	80	90	93	90	92	87	79	89	94	92	85	
RotaC											38	71	81	90	73	75	84	88	87	90	93	64	82	91	89	83	
VPI1																	95	98	94	94	81	91	94	99	96	85	
VPIC																						84	88	94	93	81	
MCV1	86	91	92	94	95	93	95	86	96	92	93	89	93	91	68	79	89	94	89	90	89	88	86	89	91	90	
RCV1		91	92	94	95	93	95	86	96	92	93	89	93	91	68	79	89	94	89	90	89	88	86	89	91	90	
MCV2																	67	89	78	78	79	79	71	78	79	84	
VPHc																				31	19	16	30	22	48	57	63



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.




Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.
 Nota: La Agenda de Inmunización 2030 (IA2030) insta a todos los países a reducir a la mitad, de aquí a 2030, el número de niños sin ninguna dosis registrado en 2019.
 Las barras de color azul oscuro representan el número estimado de niños sin ninguna dosis en el período 2000–2025, mientras que la barra de color azul claro representa el número objetivo de niños sin ninguna dosis para 2030.
 La línea y los puntos muestran el progreso anual y la trayectoria para alcanzar el objetivo en 2030, basándose en una disminución lineal.

DTP1: Llegar a los niños con dosis cero

- La cobertura de DTP1 se situó en el 86 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (96 %) y a la de 2024 (96 %).
- El porcentaje de niños que no habían recibido ninguna dosis fue 365 puntos porcentuales superior al objetivo de IA2030 en 2025. En 2025 había aproximadamente 52,000 niños sin dosis, más que los 16,000 de 2019 y más que los 15,000 de 2024.
- La cobertura de DTP1 en Guatemala (86 %) fue inferior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 89 % en 2025.
- La tasa de abandono de DTP1 a DTP3 en 2025 fue del 10 %, 2 puntos porcentuales más que en 2019 (8%). Las tasas de abandono medias de DTP indican una capacidad moderada para administrar una serie completa de vacunas en las primeras etapas de la vida.

**DTP1 cobertura y niños sin ninguna dosis
a lo largo del tiempo, Guatemala, 2000–2025**




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños

- La cobertura de DTP3 se situó en el 77 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (88 %) y a la de 2024 (90 %).
- El número de niños vacunados con DTP3 disminuyó de 341,000 en 2019 a 288,000 en 2025.
- En 2025, había 86,000 niños sin vacunar o con vacunación incompleta en Guatemala.
- En 2025, el 10 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la DTP3. Esta tasa de abandono del 10 % fue 2 puntos porcentuales superior a la de 2019 (8 %) y 4 puntos porcentuales superior a la tasa de abandono de 2024 (6 %).
- La cobertura de DTP3 en Guatemala (77 %) fue inferior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 83 % en 2025.


DTP3 cobertura y niños sin vacunar o con vacunación incompleta a lo largo del tiempo, Guatemala, 2000–2025



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

MCV: El canario en la mina de carbón


- La cobertura de MCV1 se situó en el 90 % en 2025. Este dato es igual al de 2019 (90 %) y inferior al de 2024 (91 %).
- Cobertura de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV2) aumentó del 78 % en 2019 al 84 % en 2025. Esto sigue dejando a 37,000 niños sin ninguna protección contra el sarampión y a otros 22,000 con una protección solo parcial.
- En 2025, el -5 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la MCV1. Esta tasa de abandono del -5 % fue 11 puntos porcentuales inferior a la de 2019 (6 %) y 10 puntos porcentuales inferior a la tasa de abandono de 2024 (5 %).
- Guatemala ha alcanzado una cobertura de MCV1 superior al 80 % durante los últimos 3 años.
- La cobertura de MCV1 en Guatemala (90 %) fue superior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 86 %, en 2025.



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

VPH

- La cobertura del programa de VPH1 entre las mujeres aumentó del 57 % al 63 % entre 2024 y 2025, y la cobertura de la última dosis (VPHc) también aumentó del 57 % al 63 %.
- La cobertura de VPHc sigue estando muy por debajo del objetivo del 90% de la IA2030, aunque la tendencia es ascendente.
- En 2025, aproximadamente 70,000 mujeres de Guatemala no recibieron ninguna vacuna contra el VPH (no vacunadas).
- Entre los países de la región América Latina y el Caribe, Guatemala ocupó el puesto 18 de un total de 31 países en cuanto a la cobertura de VPHc en el año 2025.




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Comparación regional

El gráfico siguiente muestra cómo se sitúa Guatemala en comparación con otros países de la región América Latina y el Caribe en cuanto a la cobertura de DTP1, DTP3, MCV1 y VPHc en 2025. La línea discontinua representa la media regional para cada vacuna.

Comparación de cobertura: Guatemala frente a los países comparables de LACR, 2025

Línea discontinua = promedio regional



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Vacunas adicionales

- La cobertura de BCG se situó en el 88 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (90 %) y a la de 2024 (93 %).
- La cobertura de HepB3 se situó en el 77 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (88 %) y a la de 2024 (90 %).
- La cobertura de Hib3 se situó en el 77 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (88 %) y a la de 2024 (90 %).
- La cobertura de VPI1 se situó en el 85 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (94 %) y a la de 2024 (96 %).
- La cobertura de PCVC se situó en el 85 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (92 %) y a la de 2024 (92 %).
- La cobertura de RotaC se situó en el 83 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (90 %) y a la de 2024 (89 %).

Cobertura adicional de vacunación (%), Guatemala, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	95	93	96	97	98	96	96	88	99	93	99	91	94	99	93	92	91	93	88	90	93	85	87	95	93	88
HepB3						87	89	85	95	92	94	88	96	96	74	70	83	91	85	88	90	80	81	88	90	77
Hib3						87	89	85	95	92	94	88	96	96	74	70	83	91	85	88	90	80	81	88	90	77
PCVC														72	62	80	90	93	90	92	87	79	89	94	92	85
RotaC											38	71	81	90	73	75	84	88	87	90	93	64	82	91	89	83
VPI1																	95	98	94	94	81	91	94	99	96	85



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Apéndice

Estimaciones de la OMS y el UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación (WUENIC)

Cada año, la OMS y el UNICEF revisan los datos nacionales de inmunización de los Estados Miembros, incluida la cobertura administrativa y oficial, las estimaciones de las encuestas y la información contextual, y utilizan un enfoque de triangulación de datos basado en reglas para evaluar la cobertura. Las estimaciones se producen de forma independiente, sin tomar datos prestados de otros países, y no se basan en ajustes ad hoc. En algunos casos, se basan en una sola fuente, normalmente la cobertura notificada a nivel nacional. Cuando no se dispone de datos para un año-vacuna-país específico, los valores de los años adyacentes se interpolan o extrapolan, y se evalúan las fuentes en conflicto para determinar la estimación más fiable, teniendo en cuenta los posibles sesgos y la opinión de expertos.

Métodos:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Estos puntos clave presentan las últimas estimaciones de la WUENIC (publicadas el 15 de julio de 2026).

Definiciones de términos de inmunización:

- Bacilo de Calmette-Guérin (BCG): vacuna contra la tuberculosis
- Dosis de nacimiento contra la hepatitis B, administrada dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento (HepBB)
- Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, primera dosis (DTP1) y tercera dosis (DTP3)
- Vacuna contra la hepatitis B, tercera dosis (HepB3)
- Vacuna contra *Haemophilus influenzae* tipo B, tercera dosis (Hib3)
- Vacuna inactivada contra la polio, primera dosis (IPV1) y última dosis (IPVC)
- Vacuna que contiene sarampión, primera dosis (MCV1) y segunda dosis (MCV2)
- Vacuna contra el rotavirus, última dosis (RotaC)
- Vacuna neumocócica, última dosis (PCV)
- Vacuna contra la fiebre amarilla (YFV)
- Vacuna contra el meningococo A (MengA)
- Vacuna contra el virus del papiloma humano, primera dosis (VPH1) y última dosis (VPHc)

Recursos adicionales: <https://data.unicef.org/resources/immunization/>