

Puntos de discusión de WUENIC: México

Año de revisión: 2025

Índice

Resumen	2
DTP1: Llegar a los niños con dosis cero	4
DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños	5
MCV: El canario en la mina de carbón	6
VPH	7
Comparación regional	8
Vacunas adicionales	9
Apéndice	10

México en la región «Americas»



Resumen


- Ninguna de las 13 vacunas infantiles de las que se tiene constancia en México alcanzó una cobertura del 90 % o superior en 2025.
- Cobertura de la primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP1) aumentó del 83 % en 2024 al 89 % en 2025, cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra DTP (DTP3) aumentó del 78 % en 2024 al 89 % en 2025, y cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV1) aumentó del 80 % en 2024 al 88 % en 2025 en 2025.
- En 2025, el número de niños sin ninguna dosis de DTP en México (218,000) fue de aproximadamente el 11 % inferior al número anual propuesto para alcanzar el objetivo IA2030 de reducir a la mitad el número de niños sin ninguna dosis de la vacuna DTP para 2030 (244,000), según una trayectoria lineal de descenso.

Cobertura vacunal (%), México, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	99	99	91	96	98	99	94	96	76	28	99	95	89	89	88
HepBB																					31	31	31	31	28	25
DTP1	99	99	99	99	99	99	99	99	98	98	96	99	99	89	95	99	96	93	90	84	77	83	93	89	83	89
DTP3	97	97	97	98	98	98	98	98	96	95	95	97	99	83	87	87	93	85	88	82	72	78	83	85	78	89
Hib3	97	97	97	98	98	98	98	98	96	95	95	97	99	83	87	87	93	85	88	82	72	78	83	85	78	89
HepB3	97	97	97	98	98	98	98	98	97	95	93	98	99	79	84	76	82	58	55	56	77	80	83	85	78	89
PCVC									14	46	92	98	99	84	94	93	92	92	88	86	77	83	84	78	76	78
RotaC									99	93	90	98	99	81	85	81	72	70	77	71	69	77	84	80	83	85
VPI1																99	96	93	90	84	77	83	93	89	83	89
VPIC																						78	83	85	78	89
MCV1	96	95	96	96	96	96	96	96	96	96	95	98	99	89	98	98	97	76	97	73	92	99	86	76	80	88
RCV1	96	95	96	96	96	96	96	96	96	96	95	98	99	89	98	98	97	76	97	73	92	99	86	76	80	88
MCV2	98	99	89	96	97	97	91	85	94	92	91	97	92	76	96	96	98	62	99	55	79	97	83	74	69	69
VPHc													45	50	54	52	54	54	53	47	5	1	64	72	75	75




Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.
 Nota: La Agenda de Inmunización 2030 (IA2030) insta a todos los países a reducir a la mitad, de aquí a 2030, el número de niños sin ninguna dosis registrado en 2019.
 Las barras de color azul oscuro representan el número estimado de niños sin ninguna dosis en el período 2000–2025, mientras que la barra de color azul claro representa el número objetivo de niños sin ninguna dosis para 2030.
 La línea y los puntos muestran el progreso anual y la trayectoria para alcanzar el objetivo en 2030, basándose en una disminución lineal.

DTP1: Llegar a los niños con dosis cero

- La cobertura de DTP1 se situó en el 89 % en 2025. Esta cifra es superior a la de 2019 (84 %) y a la de 2024 (83 %).
- El porcentaje de niños que no habían recibido ninguna dosis fue 11 puntos porcentuales inferior al objetivo de IA2030 en 2025. En 2025 había aproximadamente 218,000 niños que no habían recibido ninguna dosis, menos que los 336,000 en 2019 y menos que los 341,000 en 2024.
- La cobertura de DTP1 en México (89 %) fue igual a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 89 % en 2025.
- La tasa de abandono de DTP1 a DTP3 en 2025 fue del 0 %, 2 puntos porcentuales menos que en 2019 (2%). Las bajas tasas de abandono de DTP indican una buena capacidad para administrar una serie completa de vacunas en las primeras etapas de la vida.




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños

- La cobertura de DTP3 se situó en el 89 % en 2025. Esta cifra es superior a la de 2019 (82 %) y a la de 2024 (78 %).
- El número de niños vacunados con DTP3 aumentó de 1.7 millón en 2019 a 1.8 millón en 2025.
- En 2025, había 218,000 niños sin vacunar o con vacunación incompleta en México.
- En 2025, el 0 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la DTP3. Esta tasa de abandono del 0 % fue 2 puntos porcentuales inferior a la de 2019 (2 %) y 6 puntos porcentuales inferior a la tasa de abandono de 2024 (6 %).
- La cobertura de DTP3 en México (89 %) fue superior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 83 % en 2025.


DTP3 cobertura y niños sin vacunar o con vacunación incompleta a lo largo del tiempo, México, 2000–2025



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

MCV: El canario en la mina de carbón


- La cobertura de MCV1 se situó en el 88 % en 2025. Esta cifra es superior a la de 2019 (73 %) y a la de 2024 (80 %).
- Cobertura de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV2) aumentó del 55 % en 2019 al 69 % en 2025. Esto sigue dejando a 238,000 niños sin ninguna protección contra el sarampión y a otros 407,000 con una protección solo parcial.
- En 2025, el 1 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la MCV1. Esta tasa de abandono del 1 % fue 12 puntos porcentuales inferior a la de 2019 (13 %) y 3 puntos porcentuales inferior a la tasa de abandono de 2024 (4 %).
- Mexico ha alcanzado una cobertura de MCV1 superior al 80 % durante los últimos 3 años.
- La cobertura de MCV1 en Mexico (88 %) fue superior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 86 % en 2025.



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

VPH

- La cobertura del programa de VPH1 entre las mujeres se mantuvo constante en el 75 % entre 2024 y 2025, y la cobertura de la última dosis (VPHc) también se mantuvo constante en el 75 %.
- La cobertura de VPHc sigue estando muy por debajo del objetivo del 90% de la IA2030.
- En 2025, aproximadamente 276,000 mujeres de México no recibieron ninguna vacuna contra el VPH (no vacunadas).
- Entre los países comparables de la región América Latina y el Caribe, México ocupó el puesto 8 de un total de 31 países en cuanto a la cobertura de VPHc en el año 2025.




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Comparación regional

El gráfico siguiente muestra cómo se sitúa México en comparación con otros países de la región América Latina y el Caribe en cuanto a la cobertura de DTP1, DTP3, MCV1 y VPHc en 2025. La línea discontinua representa la media regional para cada vacuna.

Comparación de cobertura: México frente a los países comparables de LACR, 2025

Línea discontinua = promedio regional



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Vacunas adicionales

- La cobertura de BCG se situó en el 88 % en 2025. Esta cifra es superior a la de 2019 (76 %), pero inferior a la de 2024 (89 %).
- La cobertura de HepB3 se situó en el 89 % en 2025. Esta cifra es superior a la de 2019 (56 %) y a la de 2024 (78 %).
- La cobertura de Hib3 se situó en el 89 % en 2025. Esta cifra es superior a la de 2019 (82 %) y a la de 2024 (78 %).
- La cobertura de VPI1 se situó en el 89 % en 2025. Esta cifra es superior a la de 2019 (84 %) y a la de 2024 (83 %).
- La cobertura de PCVC se situó en el 78 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (86 %) pero superior a la de 2024 (76 %).
- La cobertura de RotaC se situó en el 85 % en 2025. Esta cifra es superior a la de 2019 (71 %) y a la de 2024 (83 %).

Cobertura adicional de vacunación (%), Mexico, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	99	99	91	96	98	99	94	96	76	28	99	95	89	89	88
HepB3	97	97	97	98	98	98	98	98	97	95	93	98	99	79	84	76	82	58	55	56	77	80	83	85	78	89
Hib3	97	97	97	98	98	98	98	98	96	95	95	97	99	83	87	87	93	85	88	82	72	78	83	85	78	89
PCVC									14	46	92	98	99	84	94	93	92	92	88	86	77	83	84	78	76	78
RotaC									99	93	90	98	99	81	85	81	72	70	77	71	69	77	84	80	83	85
VPI1																99	96	93	90	84	77	83	93	89	83	89



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Apéndice

Estimaciones de la OMS y el UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación (WUENIC)

Cada año, la OMS y el UNICEF revisan los datos nacionales de inmunización de los Estados Miembros, incluida la cobertura administrativa y oficial, las estimaciones de las encuestas y la información contextual, y utilizan un enfoque de triangulación de datos basado en reglas para evaluar la cobertura. Las estimaciones se producen de forma independiente, sin tomar datos prestados de otros países, y no se basan en ajustes ad hoc. En algunos casos, se basan en una sola fuente, normalmente la cobertura notificada a nivel nacional. Cuando no se dispone de datos para un año-vacuna-país específico, los valores de los años adyacentes se interpolan o extrapolan, y se evalúan las fuentes en conflicto para determinar la estimación más fiable, teniendo en cuenta los posibles sesgos y la opinión de expertos.

Métodos:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Estos puntos clave presentan las últimas estimaciones de la WUENIC (publicadas el 15 de julio de 2026).

Definiciones de términos de inmunización:

- Bacilo de Calmette-Guérin (BCG): vacuna contra la tuberculosis
- Dosis de nacimiento contra la hepatitis B, administrada dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento (HepBB)
- Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, primera dosis (DTP1) y tercera dosis (DTP3)
- Vacuna contra la hepatitis B, tercera dosis (HepB3)
- Vacuna contra *Haemophilus influenzae* tipo B, tercera dosis (Hib3)
- Vacuna inactivada contra la polio, primera dosis (IPV1) y última dosis (IPVC)
- Vacuna que contiene sarampión, primera dosis (MCV1) y segunda dosis (MCV2)
- Vacuna contra el rotavirus, última dosis (RotaC)
- Vacuna neumocócica, última dosis (PCV)
- Vacuna contra la fiebre amarilla (YFV)
- Vacuna contra el meningococo A (MengA)
- Vacuna contra el virus del papiloma humano, primera dosis (VPH1) y última dosis (VPHc)

Recursos adicionales: <https://data.unicef.org/resources/immunization/>