

Points de discussion WUENIC: Niger 🇳🇮

Année de révision : 2025

Sommaire

Aperçu	2
DTC1 : Atteindre les enfants zéro dose	4
DTC3 : Un marqueur de la prestation des services de vaccination de routine aux enfants	5
VAR : Le canari dans la mine de charbon	6
HPV	7
Comparaison régionale	8
Vaccins additionnels	9
Annexe	10

Niger dans la région « Africa »



Aperçu


- Au total, 13 vaccins destinés aux enfants font l'objet d'un suivi dans Niger ; parmi ceux-ci, 2 ont atteint l'objectif de couverture de 90 % ou plus au cours de l'année 2025.
- Couverture vaccinale pour la première dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC1) était identique en 2025 à celui de 2024 (95 %), couverture vaccinale de la troisième dose du vaccin contenant le DTC (DTC3) est passé de 86 % en 2024 à 87 % en 2025, et taux de couverture de la première dose du vaccin contre la rougeole (VAR1) est passé de 81 % en 2024 à 82 % en 2025 en 2025.
- En 2025, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de DTC dans Niger (54,000) s'élevait à environ 1 % inférieur au nombre annuel proposé pour atteindre l'objectif IA2030 consistant à réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose du vaccin DTC d'ici 2030 (55,000), sur la base d'une trajectoire de baisse linéaire.

Taux de couverture vaccinale (%), Niger, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	50	53	56	58	61	64	69	73	78	86	81	53	85	43	87	94	91	92	87	70	94	95	95	93	93	88
DTC1	46	48	51	53	56	58	64	69	76	81	83	86	87	89	95	93	92	95	91	92	93	94	96	94	95	95
DTC3	34	36	39	41	43	45	52	58	67	71	70	75	73	75	82	84	80	85	79	81	81	82	84	85	86	87
Hib3										71	70	75	73	75	82	84	80	85	79	81	81	82	84	85	86	87
HepB3										71	70	75	73	75	82	84	80	85	79	81	81	82	84	85	86	87
PCVC															13	49	76	85	79	81	81	82	84	85	86	87
RotaC															19	47	80	85	79	81	83	85	86	88	90	91
VPI1															27	74	85	79	81	81	82	84	85	86	87	
VPIC																							73	82	83	83
VAR1	37	39	41	43	45	47	53	60	66	69	67	69	75	80	80	85	76	82	77	79	79	80	65	80	81	82
VAR2															3	16	31	46	48	58	60	66	42	68	77	80
YFV	10	15	21	26	32	37	32	32	47	67	64	52	73	75	79	84	76	82	78	83	67	80	80	80	81	82
MengA																										



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.




Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.
 Remarque : Le Programme de vaccination 2030 (IA2030) appelle tous les pays à réduire de moitié d'ici 2030 le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose en 2019.
 Les barres bleu foncé représentent le nombre estimé d'enfants n'ayant reçu aucune dose entre 2000 et 2025, la barre bleu clair correspond au nombre cible d'enfants n'ayant reçu aucune dose d'ici 2030.
 La courbe et les points illustrent les progrès annuels et la trajectoire permettant d'atteindre l'objectif d'ici 2030, sur la base d'une baisse linéaire.

DTC1 : Atteindre les enfants zéro dose

- Le taux de couverture vaccinale pour le DTC1 s'élevait à 95 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (92 %) et identique à celui de 2024 (95 %).
- Le pourcentage d'enfants n'ayant reçu aucune dose était inférieur de 1 points de pourcentage à l'objectif fixé par l'IA2030 en 2025. On comptait environ 54,000 enfants n'ayant reçu aucune dose en 2025, soit moins que les 76,000 enregistrés en 2019, mais plus que les 53,000 recensés en 2024.
- Le taux de couverture vaccinale contre DTC1 à Niger (95 %) était supérieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 81 % en 2025.
- Le taux d'abandon entre DTC1 et DTC3 pour l'année 2025 s'élevait à 8 %, soit 4 points de pourcentage de moins qu'en 2019 (12 %). Des taux d'abandon moyens DTC indiquent une capacité modérée à assurer une série complète de vaccins dès le plus jeune âge.

DTC1 : couverture vaccinale et enfants n'ayant reçu aucune dose au fil du temps, Niger, 2000–2025




Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025. La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030.

DTC3 : Un marqueur de la prestation des services de vaccination de routine aux enfants

- Le taux de couverture de DTC3 s'élevait à 87 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (81 %) et à celui de 2024 (86 %).
- Le nombre d'enfants vaccinés avec le DTC3 est passé de 765,000 en 2019 à 942,000 en 2025.
- En 2025, 141,000 enfants n'étaient pas vaccinés ou l'étaient de manière insuffisante dans Niger.
- En 2025, 8 % des enfants ayant reçu le DTC1 n'ont pas reçu le DTC3. Ce taux d'abandon de 8 % était inférieur de 4 points de pourcentage à celui de 2019 (12 %) et de 1 points de pourcentage inférieur au taux d'abandon de 2024 (9 %).
- Le taux de couverture vaccinale contre DTC3 à Niger (87 %) était supérieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 71 % en 2025.


DTC3 : taux de couverture vaccinale et nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés au fil du temps, Niger, 2000–2025



La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

VAR : Le canari dans la mine de charbon

- Le taux de couverture de VAR1 s'élevait à 82 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (79 %) et à celui de 2024 (81 %).
- Couverture vaccinale pour la deuxième dose du vaccin contre la rougeole (VAR2) est passé de 58 % en 2019 à 80 % en 2025. Cela signifie que 195,000 enfants ne bénéficient toujours d'aucune protection contre la rougeole et que <100 autres ne bénéficient que d'une protection partielle.
- En 2025, 14 % des enfants ayant reçu le DTC1 n'ont pas reçu le VAR1. Ce taux d'abandon de 14 % était identique à celui de 2019 (14 %), mais inférieur de 1 points de pourcentage au taux d'abandon de 2024 (15 %).
- Niger a atteint une couverture de VAR1 supérieure à 80 % au cours des 3 dernières années.
- Le taux de couverture vaccinale contre VAR1 à Niger (82 %) était supérieur à la moyenne régionale de Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'élevait à 64 % en 2025.



La ligne pointillée indique l'objectif de couverture de 90 % de l'IA2030
 Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

HPV


- En 2025, Niger n'avait pas encore mis en place la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV).

Comparaison régionale

Le graphique ci-dessous compare Niger aux autres pays de la région Afrique de l'Ouest et du Centre en termes de couverture vaccinale contre DTC1, DTC3 et VAR1 pour l'année 2025. La ligne pointillée représente la moyenne régionale pour chaque vaccin.

Comparaison de la couverture : Niger par rapport aux pays comparables de la WCAR, 2025

Ligne pointillée = moyenne régionale




Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Vaccins additionnels

- Le taux de couverture du BCG s'élevait à 88 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (70 %), mais inférieur à celui de 2024 (93 %).
- La couverture vaccinale du HepB3 s'élevait à 87 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (81 %) et à celui de 2024 (86 %).
- La couverture vaccinale du Hib3 s'élevait à 87 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (81 %) et à celui de 2024 (86 %).
- La couverture vaccinale du VPI1 s'élevait à 87 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (81 %) et à celui de 2024 (86 %).
- La couverture vaccinale du PCVC s'élevait à 87 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (81 %) et à celui de 2024 (86 %).
- La couverture vaccinale du RotaC s'élevait à 91 % en 2025. Ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (81 %) et à celui de 2024 (90 %).

Couverture vaccinale supplémentaire (%), Niger, 2000–2025



Source : Estimations de l'OMS et de l'UNICEF concernant la couverture vaccinale nationale, révision de 2025.

Annexe

Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC)

Chaque année, l'OMS et l'UNICEF examinent les données nationales sur la vaccination des États membres, y compris la couverture administrative et officielle, les estimations des enquêtes et les informations contextuelles, et utilisent une approche de triangulation des données basée sur des règles pour évaluer la couverture. Les estimations sont produites de manière indépendante, sans emprunter de données à d'autres pays, et ne sont pas basées sur des ajustements ad hoc. Dans certains cas, elles reposent sur une source unique, généralement la couverture déclarée au niveau national. Lorsque les données pour une année pays-vaccin spécifique ne sont pas disponibles, les valeurs des années adjacentes sont interpolées ou extrapolées, et les sources contradictoires sont évaluées pour déterminer l'estimation la plus fiable, en tenant compte des biais potentiels et des avis d'experts.

Méthodes:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Ces points clés présentent les dernières estimations du WUENIC (publiées le 15 juillet 2026).

Définitions des termes de vaccination :

- Bacillus Calmette-Guérin (BCG) : vaccin contre la tuberculose
- Dose de naissance contre l'hépatite B, administrée dans les 24 heures suivant la naissance (HepBB)
- Vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, première dose (DTC1) et troisième dose (DTC3)
- Vaccin contre l'hépatite B, troisième dose (HepB3)
- Vaccin contre l'Haemophilus influenzae de type b, troisième dose (Hib3)
- Vaccin antipoliomyélitique inactivé, première dose (VPI1) et dernière dose (VPIc)
- Vaccins contenant la valence rougeole, première dose (VAR1) et seconde dose (VAR2)
- Vaccin contre le rotavirus, dernière dose (RotaC)
- Vaccin pneumococcique, dernière dose (PCV)
- Vaccin contre la fièvre jaune (YFV)
- Vaccin contre le méningocoque A (MengA)
- Vaccin contre le virus du papillome humain, première dose (HPV1) et dernière dose (HPVc)

Ressources additionnelles : <https://data.unicef.org/resources/immunization/>