

Índice

Resumen	2
DTP1: Llegar a los niños con dosis cero	4
DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños	5
MCV: El canario en la mina de carbón	6
VPH	7
Comparación regional	8
Vacunas adicionales	9
Apéndice	10

Panamá en la región «Americas»



Resumen


- En Panamá se realiza un seguimiento de un total de 14 vacunas infantiles; de ellas, 4 alcanzaron el objetivo de cobertura del 90 % o más en 2025.
- Cobertura de la primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP1) aumentó del 93 % en 2024 al 94 % en 2025, cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra DTP (DTP3) aumentó del 72 % en 2024 al 80 % en 2025, y cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV1) descendió del 96 % en 2024 al 87 % en 2025 en 2025.
- En 2025, el número de niños sin ninguna dosis de DTP en Panamá (4,000) fue de aproximadamente el 166 % superior al número anual propuesto para alcanzar el objetivo IA2030 de reducir a la mitad el número de niños sin ninguna dosis de la vacuna DTP para 2030 (2,000), según una trayectoria lineal de descenso.

Cobertura vacunal (%), Panamá, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	99	99	99	99	99	99	98	97	98	99	99	99	98	95	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
HepBB		2	30	57	85	75	79	83	80	78	89	93	87	79	84	85	84	87	85	85	86	87	97	91	89	92
DTP1	99	99	99	99	98	95	96	97	93	95	96	98	99	93	96	96	96	96	97	97	93	98	98	91	93	94
DTP3	98	99	99	98	95	92	88	85	86	85	94	87	85	80	80	73	86	81	88	88	74	87	82	71	72	80
Hib3		99	99	98	95	92	88	85	86	85	94	87	85	80	80	73	86	81	88	88	74	87	82	71	72	80
HepB3		98	98	98	95	92	88	85	86	85	94	87	85	80	80	73	86	81	88	88	74	87	82	71	72	80
PCVC											48	63	76	88	91	92	94	97	97	96	74	87	84	77	85	77
RotaC							82	66	74	78	89	95	92	87	87	87	92	94	95	94	86	84	86	85	91	87
VPI1																80	96	96	97	97	93	98	98	91	93	94
VPIC																						87	82	71	72	80
MCV1	97	95	95	95	97	99	95	95	96	96	97	97	98	92	90	93	95	98	98	97	80	92	87	88	96	87
RCV1	97	95	95	95	97	99	95	95	96	96	97	97	98	92	90	93	95	98	98	97	80	92	87	88	96	87
MCV2	88	88	88	89	89	89	86	83	79	76	73	81	72	68	90	92	93	93	99	97	74	75	75	77	85	85
YFV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	5	5	6	6	6	7	5	5	6	4	6	5
VPHc											65	79	79	75	80	58	77	72	69	74	45	47	66	71	64	70




Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.
 Nota: La Agenda de Inmunización 2030 (IA2030) insta a todos los países a reducir a la mitad, de aquí a 2030, el número de niños sin ninguna dosis registrado en 2019.
 Las barras de color azul oscuro representan el número estimado de niños sin ninguna dosis en el período 2000–2025, mientras que la barra de color azul claro representa el número objetivo de niños sin ninguna dosis para 2030.
 La línea y los puntos muestran el progreso anual y la trayectoria para alcanzar el objetivo en 2030, basándose en una disminución lineal.

DTP1: Llegar a los niños con dosis cero

- La cobertura de DTP1 se situó en el 94 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (97 %) y superior a la de 2024 (93 %).
- El porcentaje de niños que no habían recibido ninguna dosis fue 166 puntos porcentuales superior al objetivo de IA2030 en 2025. En 2025 había aproximadamente 4,000 niños que no habían recibido ninguna dosis, más que los 2,000 de 2019, pero menos que los 5,000 de 2024.
- La cobertura de DTP1 en Panamá (94 %) fue superior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 89 % en 2025.
- La tasa de abandono de DTP1 a DTP3 en 2025 fue del 15 %, 6 puntos porcentuales más que en 2019 (9%). Las elevadas tasas de abandono de DTP indican una escasa capacidad para administrar una serie completa de vacunas en las primeras etapas de la vida.




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños

- La cobertura de DTP3 se situó en el 80 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (88 %) y superior a la de 2024 (72 %).
- El número de niños vacunados con DTP3 disminuyó de 65,000 en 2019 a 57,000 en 2025.
- En 2025, había 14,000 niños sin vacunar o con vacunación incompleta en Panamá.
- En 2025, el 15 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la DTP3. Esta tasa de abandono del 15 % fue 6 puntos porcentuales superior a la de 2019 (9 %), pero 8 puntos porcentuales inferior a la tasa de abandono de 2024 (23 %).
- La cobertura de DTP3 en Panamá (80 %) fue inferior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 83 % en 2025.

DTP3 cobertura y niños sin vacunar o con vacunación incompleta a lo largo del tiempo, Panamá, 2000–2025




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

MCV: El canario en la mina de carbón

- La cobertura de MCV1 se situó en el 87 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (97 %) y a la de 2024 (96 %).
- Cobertura de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV2) disminuyó del 97 % en 2019 al 85 % en 2025. Esto deja a 9,000 niños sin ninguna protección contra el sarampión y a otros 1,000 con una protección solo parcial.
- En 2025, el 7 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la MCV1. Esta tasa de abandono del 7 % fue 7 puntos porcentuales superior a la de 2019 (0 %) y 10 puntos porcentuales superior a la tasa de abandono de 2024 (-3 %).
- Panama ha alcanzado una cobertura de MCV1 superior al 80 % durante los últimos 3 años.
- La cobertura de MCV1 en Panama (87 %) fue superior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 86 % en 2025.


MCV cobertura y MCV niños sin ninguna dosis a lo largo del tiempo, Panama, 2000-2025



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

VPH

- La cobertura del programa de VPH1 entre las mujeres aumentó del 80 % al 81 % entre 2024 y 2025, y la cobertura de la última dosis (VPHc) también aumentó del 64 % al 70 %.
- La cobertura de VPHc sigue estando muy por debajo del objetivo del 90% de la IA2030, aunque la tendencia es ascendente.
- En 2025, aproximadamente 7,000 mujeres de Panamá no recibieron ninguna vacuna contra el VPH (no vacunadas).
- Entre los países comparables de la región América Latina y el Caribe, Panamá ocupó el puesto 13 de un total de 31 países en cuanto a la cobertura de VPHc en el año 2025.




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Comparación regional

El gráfico siguiente muestra cómo se sitúa Panamá en comparación con otros países de la región América Latina y el Caribe en cuanto a la cobertura de DTP1, DTP3, MCV1 y VPHc en 2025. La línea discontinua representa la media regional para cada vacuna.

Comparación de cobertura: Panamá frente a los países comparables de LACR, 2025

Línea discontinua = promedio regional



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Vacunas adicionales

- La cobertura de BCG se situó en el 99 % en 2025. Este porcentaje es el mismo que en 2019 (99 %) y el mismo que en 2024 (99 %).
- La cobertura de HepB3 se situó en el 80 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (88 %), pero superior a la de 2024 (72 %).
- La cobertura de Hib3 se situó en el 80 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (88 %), pero superior a la de 2024 (72 %).
- La cobertura de VPI1 se situó en el 94 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (97 %), pero superior a la de 2024 (93 %).
- La cobertura de PCVC se situó en el 77 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (96 %) y a la de 2024 (85 %).
- La cobertura de RotaC se situó en el 87 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (94 %) y a la de 2024 (91 %).

Cobertura adicional de vacunación (%), Panama, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	99	99	99	99	99	99	98	97	98	99	99	99	98	95	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
HepB3		98	98	98	95	92	88	85	86	85	94	87	85	80	80	73	86	81	88	88	74	87	82	71	72	80
Hib3		99	99	98	95	92	88	85	86	85	94	87	85	80	80	73	86	81	88	88	74	87	82	71	72	80
PCVC											48	63	76	88	91	92	94	97	97	96	74	87	84	77	85	77
RotaC						82	66	74	78	89	95	92	87	87	87	87	92	94	95	94	86	84	86	85	91	87
VPI1																80	96	96	97	97	93	98	98	91	93	94



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Apéndice

Estimaciones de la OMS y el UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación (WUENIC)

Cada año, la OMS y el UNICEF revisan los datos nacionales de inmunización de los Estados Miembros, incluida la cobertura administrativa y oficial, las estimaciones de las encuestas y la información contextual, y utilizan un enfoque de triangulación de datos basado en reglas para evaluar la cobertura. Las estimaciones se producen de forma independiente, sin tomar datos prestados de otros países, y no se basan en ajustes ad hoc. En algunos casos, se basan en una sola fuente, normalmente la cobertura notificada a nivel nacional. Cuando no se dispone de datos para un año-vacuna-país específico, los valores de los años adyacentes se interpolan o extrapolan, y se evalúan las fuentes en conflicto para determinar la estimación más fiable, teniendo en cuenta los posibles sesgos y la opinión de expertos.

Métodos:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Estos puntos clave presentan las últimas estimaciones de la WUENIC (publicadas el 15 de julio de 2026).

Definiciones de términos de inmunización:

- Bacilo de Calmette-Guérin (BCG): vacuna contra la tuberculosis
- Dosis de nacimiento contra la hepatitis B, administrada dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento (HepBB)
- Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, primera dosis (DTP1) y tercera dosis (DTP3)
- Vacuna contra la hepatitis B, tercera dosis (HepB3)
- Vacuna contra *Haemophilus influenzae* tipo B, tercera dosis (Hib3)
- Vacuna inactivada contra la polio, primera dosis (IPV1) y última dosis (IPVC)
- Vacuna que contiene sarampión, primera dosis (MCV1) y segunda dosis (MCV2)
- Vacuna contra el rotavirus, última dosis (RotaC)
- Vacuna neumocócica, última dosis (PCV)
- Vacuna contra la fiebre amarilla (YFV)
- Vacuna contra el meningococo A (MengA)
- Vacuna contra el virus del papiloma humano, primera dosis (VPH1) y última dosis (VPHc)

Recursos adicionales: <https://data.unicef.org/resources/immunization/>