

Puntos de discusión de WUENIC: Perú

Año de revisión: 2025

Índice

Resumen	2
DTP1: Llegar a los niños con dosis cero	3
DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños	4
MCV: El canario en la mina de carbón	5
VPH	6
Comparación regional	7
Vacunas adicionales	8
Apéndice	9

Peru en la región «Americas»



Resumen

- En Perú se realiza un seguimiento de un total de 14 vacunas infantiles; de ellas, 2 alcanzaron el objetivo de cobertura del 90 % o superior en 2025.
- Cobertura de la primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP1) fue igual en 2025 que en 2024 (92 %), cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra DTP (DTP3) fue igual en 2025 que en 2024 (84 %), y cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV1) fue igual en 2025 que en 2024 (84 %) en 2025.
- En 2025, el número de niños sin ninguna dosis de DTP en Perú (42,000) fue de aproximadamente 260 % superior al número anual propuesto para alcanzar el objetivo IA2030 de reducir a la mitad el número de niños sin ninguna dosis de la vacuna DTP para 2030 (12,000), según una trayectoria lineal de descenso.


Cobertura vacunal (%), Perú, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	93	87	92	94	95	95	96	96	97	97	95	91	95	95	94	91	90	92	94	94	87	87	89	87	87	87
HepBB				60	68	67	66	73	79	71	74	76	81	82	78	79	81	82	83	82	75	77	79	83	83	83
DTP1	99	91	98	98	93	94	96	93	97	97	97	94	99	97	98	97	96	96	97	97	93	90	93	92	92	92
DTP3	98	90	95	94	86	77	94	93	93	93	93	91	95	88	88	90	90	89	89	88	72	82	82	84	84	84
Hib3	43	38	40	41	96	94	94	93	93	93	93	91	95	88	88	90	90	89	89	88	72	82	82	84	84	84
HepB3				65	92	94	94	93	93	93	93	91	95	88	88	90	90	89	89	88	72	82	82	84	84	84
PCVC										9	73	82	89	85	86	90	86	84	82	80	74	75	71	80	80	80
RotaC									3	41	75	84	91	86	86	87	89	89	90	90	76	82	84	87	87	87
VPI1																98	94	95	95	96	92	89	93	91	91	91
VPIC																						84	89	84	84	84
MCV1	97	97	95	95	85	77	93	92	92	91	94	96	94	85	89	92	89	88	86	85	77	78	74	84	84	84
RCV1				95	85	77	93	92	92	91	94	96	94	85	89	92	89	88	86	85	77	78	74	84	84	84
MCV2									9	17	42	56	70	63	54	44	63	68	67	67	66	52	60	54	66	66
YFV	8	26	36	47	57	78	91	87	82	66	55	51	58	64	65	67	65	62	60	57	50	61	52	61	61	61
VPHc													64	0	0	49	51	43	35	32	33	40	29	43	78	74



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.


Número estimado de niños sin ninguna dosis, 2000–2025 y objetivo para 2030, Perú



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.
 Nota: La Agenda de Inmunización 2030 (IA2030) insta a todos los países a reducir a la mitad, de aquí a 2030, el número de niños sin ninguna dosis registrado en 2019. Las barras de color azul oscuro representan el número estimado de niños sin ninguna dosis en el periodo 2000–2025, mientras que la barra de color azul claro representa el número objetivo de niños sin ninguna dosis para 2030. La línea y los puntos muestran el progreso anual y la trayectoria para alcanzar el objetivo en 2030, basándose en una disminución lineal.

DTP1: Llegar a los niños con dosis cero

- La cobertura de DTP1 se situó en el 92 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (97 %) e igual a la de 2024 (92 %).
- El porcentaje de niños que no habían recibido ninguna dosis fue 260 puntos porcentuales superior al objetivo de IA2030 en 2025. En 2025 había aproximadamente 42,000 niños que no habían recibido ninguna dosis, más que los 16,000 de 2019, pero menos que los 43,000 de 2024.
- La cobertura de DTP1 en Perú (92 %) fue superior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 89 % en 2025.
- La tasa de abandono de DTP1 a DTP3 en 2025 fue del 9 %, igual que en 2019. Las tasas de abandono medias de DTP indican una capacidad moderada para administrar una serie completa de vacunas en las primeras etapas de la vida.




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

DTP3: Un marcador de la prestación de servicios de inmunización sistemática a los niños

- La cobertura de DTP3 se situó en el 84 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (88 %) e igual a la de 2024 (84 %).
- El número de niños vacunados con DTP3 disminuyó de 476,000 en 2019 a 446,000 en 2025.
- En 2025, había 85,000 niños sin vacunar o con vacunación incompleta en Perú.
- En 2025, el 9 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la DTP3. Esta tasa de abandono del 9 % fue la misma que en 2019 (9 %) y la misma que la tasa de abandono de 2024 (9 %).
- La cobertura de DTP3 en Perú (84 %) fue superior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 83 % en 2025.


DTP3 cobertura y niños sin vacunar o con vacunación incompleta a lo largo del tiempo, Perú, 2000–2025



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

MCV: El canario en la mina de carbón


- La cobertura de MCV1 se situó en el 84 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (85 %) e igual a la de 2024 (84 %).
- Cobertura de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión (MCV2) se mantuvo relativamente estable, con una variación de menos de un punto porcentual respecto al nivel de 2019. Esto deja a 85,000 niños sin ninguna protección contra el sarampión y a otros 97,000 con una protección solo parcial.
- En 2025, el 9 % de los niños que recibieron la DTP1 no recibieron la MCV1. Esta tasa de abandono del 9 % fue 3 puntos porcentuales inferior a la de 2019 (12 %) e igual a la tasa de abandono de 2024 (9 %).
- Peru ha alcanzado una cobertura de MCV1 superior al 80 % durante los últimos 3 años.
- La cobertura de MCV1 en Peru (84 %) fue inferior a la media regional de América Latina y el Caribe, que se situó en el 86 % en 2025.



La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

VPH

- La cobertura del programa de VPH1 entre las mujeres aumentó del 74 % al 80 % entre 2024 y 2025, y la cobertura de la última dosis (VPHc) también aumentó del 74 % al 80 %.
- La cobertura de VPHc se está acercando al objetivo del 90% de la IA2030 y tiene una tendencia ascendente.
- En 2025, aproximadamente 56,000 mujeres de Peru no recibieron ninguna vacuna contra el VPH (no vacunadas).
- Entre los países comparables de la región América Latina y el Caribe, Peru ocupó el puesto 6 de un total de 31 países en cuanto a la cobertura de VPHc en el año 2025.




La línea de puntos muestra el objetivo de la IA2030 de una cobertura del 90%
 Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Comparación regional

El gráfico siguiente muestra cómo se sitúa Perú en comparación con otros países de la región América Latina y el Caribe en cuanto a la cobertura de DTP1, DTP3, MCV1 y VPHc en 2025. La línea discontinua representa la media regional para cada vacuna.

Comparación de cobertura: Perú frente a los países comparables de LACR, 2025

Línea discontinua = promedio regional



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Vacunas adicionales

- La cobertura de BCG se situó en el 87 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (94 %) e igual a la de 2024 (87 %).
- La cobertura de HepB3 se situó en el 84 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (88 %) e igual a la de 2024 (84 %).
- La cobertura de Hib3 se situó en el 84 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (88 %) e igual a la de 2024 (84 %).
- La cobertura de VPI1 se situó en el 91 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (96 %) e igual a la de 2024 (91 %).
- La cobertura de PCVC se situó en el 80 % en 2025. Este porcentaje es el mismo que en 2019 (80 %) y el mismo que en 2024 (80 %).
- La cobertura de RotaC se situó en el 87 % en 2025. Esta cifra es inferior a la de 2019 (90 %) e igual a la de 2024 (87 %).

Cobertura adicional de vacunación (%), Perú, 2000–2025

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BCG	93	87	92	94	95	95	96	96	97	97	95	91	95	95	94	91	90	92	94	94	87	87	89	87	87	87
HepB3				65	92	94	94	93	93	93	93	91	95	88	88	90	90	89	89	88	72	82	82	84	84	84
Hib3	43	38	40	41	96	94	94	93	93	93	93	91	95	88	88	90	90	89	89	88	72	82	82	84	84	84
PCVC										9	73	82	89	85	86	90	86	84	82	80	74	75	71	80	80	80
RotaC									3	41	75	84	91	86	86	87	89	89	90	90	76	82	84	87	87	87
VPI1																98	94	95	95	96	92	89	93	91	91	91



Fuente: Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación, revisión de 2025.

Apéndice

Estimaciones de la OMS y el UNICEF sobre la cobertura nacional de vacunación (WUENIC)

Cada año, la OMS y el UNICEF revisan los datos nacionales de inmunización de los Estados Miembros, incluida la cobertura administrativa y oficial, las estimaciones de las encuestas y la información contextual, y utilizan un enfoque de triangulación de datos basado en reglas para evaluar la cobertura. Las estimaciones se producen de forma independiente, sin tomar datos prestados de otros países, y no se basan en ajustes ad hoc. En algunos casos, se basan en una sola fuente, normalmente la cobertura notificada a nivel nacional. Cuando no se dispone de datos para un año-vacuna-país específico, los valores de los años adyacentes se interpolan o extrapolan, y se evalúan las fuentes en conflicto para determinar la estimación más fiable, teniendo en cuenta los posibles sesgos y la opinión de expertos.

Métodos:

- [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes](#)
- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage](#)

Estos puntos clave presentan las últimas estimaciones de la WUENIC (publicadas el 15 de julio de 2026).

Definiciones de términos de inmunización:

- Bacilo de Calmette-Guérin (BCG): vacuna contra la tuberculosis
- Dosis de nacimiento contra la hepatitis B, administrada dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento (HepBB)
- Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, primera dosis (DTP1) y tercera dosis (DTP3)
- Vacuna contra la hepatitis B, tercera dosis (HepB3)
- Vacuna contra *Haemophilus influenzae* tipo B, tercera dosis (Hib3)
- Vacuna inactivada contra la polio, primera dosis (IPV1) y última dosis (IPVC)
- Vacuna que contiene sarampión, primera dosis (MCV1) y segunda dosis (MCV2)
- Vacuna contra el rotavirus, última dosis (RotaC)
- Vacuna neumocócica, última dosis (PCV)
- Vacuna contra la fiebre amarilla (YFV)
- Vacuna contra el meningococo A (MengA)
- Vacuna contra el virus del papiloma humano, primera dosis (VPH1) y última dosis (VPHc)

Recursos adicionales: <https://data.unicef.org/resources/immunization/>