



NA

Révision WUENIC 2025,
Publié le 15 juillet 2026



Traduit à l'aide de l'API DeepL Pro



Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC), révision 2025

Chaque année, l'OMS et l'UNICEF examinent conjointement les documents soumis par les États membres sur la couverture vaccinale nationale, y compris la couverture administrative et officielle annuelle, les rapports d'enquête finalisés et les données provenant de la littérature publiée et de la littérature grise. Les données sont triangulées en tenant compte des biais potentiels et des avis d'experts locaux afin de différencier les données empiriques représentatives données potentiellement trompeuses, et d'évaluer les niveaux de couverture les plus probables pour chaque pays.

L'OMS et l'UNICEF produisent des estimations spécifiques à chaque pays en examinant les données de chaque pays de manière indépendante, sans emprunter celles d'autres pays lorsque des données sont manquantes. Les estimations ne sont pas des ajustements ponctuels des chiffres déclarés et peuvent s'appuyer sur une seule source empirique, généralement la couverture déclarée au niveau national. Lorsqu'il n'existe aucune donnée pour un pays, un vaccin ou une année spécifiques, les données antérieures et postérieures sont interpolées. Si les sources sont contradictoires ou varient considérablement, l'estimation la plus plausible est sélectionnée après avoir pris en compte les biais potentiels.

Cette présentation PowerPoint présente les dernières estimations du WUENIC (publiées le 15 juillet 2026), en utilisant les projections démographiques mondiales du UNPD (WPP 2024) pour les moyennes pondérées en fonction de la population et pour calculer le nombre absolu d'enfants vaccinés et non vaccinés/n'ayant reçu aucune dose.

Méthodes: • [Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes.](#)

- [Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach.](#)
- [Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage.](#)
- [Danovaro-Holliday et al. 2021. Compliance of WUENIC with Guidelines for Accurate and Transparent Health Estimates Reporting \(GATHER\) criteria.](#)

Définitions des termes relatifs à la vaccination

Couverture vaccinale

Pourcentage de nourrissons (enfants de moins d'un an) ayant reçu certaines doses de vaccin. Par exemple, la couverture du DTC3 est le pourcentage de nourrissons ayant reçu les trois doses de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC).

Non vacciné

Un nourrisson qui n'a pas reçu la première dose d'une série de vaccins. Le terme « zéro dose » est utilisé pour décrire les enfants qui n'ont pas reçu la première dose du DTC1.

Sous-vacciné

Nourrisson qui a reçu certaines des doses de vaccin recommandées dans le calendrier national, mais pas toutes.

Doses de vaccin

- Bacille de Calmette-Guérin (BCG) : vaccin contre la tuberculose
- Hépatite B : dose de naissance, administrée dans les 24 heures suivant la naissance (HepBB)
- Vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, première dose (DTP1) et troisième dose (DTP3)
- Vaccin contre l'hépatite B, troisième dose (HepB3)
- Vaccin contre l'haemophilus influenzae de type b, troisième dose (Hib3)
- Vaccin antipoliomyélitique inactivé, première dose (IPV1) et dernière dose (IPVC)
- Vaccin contenant de la rougeole, première dose (MCV1) et deuxième dose (MCV2)
- Vaccin antirotavirus, dernière dose (RotaC)
- Vaccin antipneumococcique, dernière dose (PCVC)
- Vaccin contre la fièvre jaune (YFV)
- Vaccin méningococcique A (MengA)
- Vaccin contre le papillomavirus humain, première dose (HPV1) et dernière dose (HPVc) : vaccin destiné à protéger contre certains types de papillomavirus humains pouvant entraîner un cancer ou des verrues génitales.

L'Agenda 2030 pour la vaccination (IA2030)

L'AI2030 est une stratégie mondiale approuvée par l'Assemblée mondiale de la santé qui vise à faire en sorte que chacun, partout et à tout âge, bénéficie de vaccins pour améliorer sa santé et son bien-être d'ici à 2030. Il se concentre sur l'augmentation de la couverture vaccinale, l'équité, la durabilité et la préparation aux pandémies, tout en promouvant la vaccination tout au long de la vie et en intégrant la vaccination à d'autres services de santé.

Concepts clés

- L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) fournit des recommandations mondiales en matière de vaccination, adaptées par les pays en fonction des besoins locaux. Seuls les vaccins DTC, antipoliomyélitique et antirougeoleux sont utilisés dans tous les pays.
- Le DTC1 est un indicateur de l'accès aux services de vaccination systématique. Lorsqu'il n'est pas administré, il sert de proxy pour identifier les enfants qui n'ont reçu aucun vaccin, également appelés « enfants zéro dose ». Une couverture élevée en DTC1 indique un bon accès aux services de vaccination, tandis qu'une couverture faible suggère des difficultés à atteindre les enfants avec les vaccins essentiels.
- Le DTC3 est un indicateur largement utilisé de la performance des programmes de vaccination. Il reflète la capacité d'un pays à fournir des services de vaccination systématique et à garantir la protection des enfants contre les maladies graves. Le DTC3 fait l'objet d'un suivi mondial et constitue une mesure clé des efforts de vaccination d'un pays.
- L'abandon du DTC1-DTC3 mesure le pourcentage d'enfants ayant reçu le DTC1 mais pas le DTC3. Il met en évidence les enfants perdus de vue tout au long du parcours de vaccination, soulignant ainsi les faiblesses potentielles dans la prestation des services et le suivi.
- Le MCV1 (généralement recommandé entre 9 et 12 mois) évalue la capacité à administrer les vaccins plus tard dans la petite enfance. Il sert de traceur pour la protection contre la rougeole et constitue un bon indicateur de la performance du système de santé.
- Le vaccin contre le HPV protège contre certains types spécifiques du virus du papillome humain (HPV) et sert à mesurer le cycle de vie de la vaccination.
- Parmi les autres indicateurs clés, citons le PCVC et le MCV2, qui sont utilisés pour suivre les objectifs de développement durable (ODD).
- Ensemble, ces indicateurs offrent un moyen cohérent et comparable de suivre les progrès de la vaccination, d'identifier les communautés oubliées et de suivre les objectifs mondiaux, notamment ceux du Programme de vaccination à l'horizon 2030 (PA2030) et des Objectifs de développement durable (ODD).

Messages clés

- La couverture vaccinale contre la DTP1 est restée stable à 95 % entre 2024 et 2025.
- La couverture vaccinale contre la DTP3 est restée stable à 90 % entre 2024 et 2025.
- Le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose était à peu près le même en 2025. Cela représente 14 000 enfants non vaccinés, exposés aux maladies évitables par la vaccination, et 14 000 autres dont la protection est incomplète.
- Le Togo représentait 0,4 % des enfants n'ayant reçu aucune dose en Afrique de l'Ouest et du Centre (<keep>WCAR</keep>) et 0,1 % des enfants n'ayant reçu aucune dose à l'échelle mondiale.
- La couverture de la première dose de vaccin contre la rougeole (MCV1) est restée stable à 81 % entre 2024 et 2025. 54 000 enfants n'ont pas reçu la première dose de vaccin contre la rougeole.
- La couverture de la deuxième dose de vaccin contre la rougeole (MCV2) est restée stable à 58 % entre 2024 et 2025.
- La couverture de la dernière dose du vaccin contre le HPV (HPVc) chez les filles est passée de 36 % à 87 % en 2025 grâce à l'amélioration des performances du programme.

Calendrier de vaccination, 2025

Level	Vaccine	Dose number and age administered			
		1	2	3	4
National	BCG	Birth			
National	DTWPHIBHEPB	6 weeks	10 weeks	14 weeks	
National	HPV (females)	9 years			
National	IPV	14 weeks	9 months		
National	MALARIA	5 months	6 months	7 months	15 months
National	MenA	15 months			
National	MR	9 months	15 months		
National	OPV	Birth	6 weeks	10 weeks	14 weeks
National	PCV	6 weeks	10 weeks	14 weeks	
National	Rotavirus	6 weeks	10 weeks		
National	YF	9 months			

Ce tableau présente le calendrier national de vaccination 2025 pour les services de routine dans Togo, tel que rapporté dans le formulaire commun de notification sur la vaccination (JRF) de l'OMS/UNICEF.

Chaque ligne correspond à un vaccin ou à un vaccin combiné, indiquant s'il est administré au niveau national ou infranational. Le calendrier précise le nombre de doses et les âges recommandés pour l'administration. Seuls les vaccins destinés aux enfants et aux adolescents pertinents pour le WUENIC sont inclus.

unicef





World Health Organization

WUENIC 2025 revision

Années d'introduction du vaccin

Vaccine	National introduction
HPV (Human papillomavirus) vaccine	2023
HepB birth dose	Not introduced
Hepatitis B vaccine	2008
Hib (Haemophilus influenzae type B) vaccine	2008
IPV (Inactivated polio vaccine)	2018
IPV (Inactivated polio vaccine) 2nd dose	2022
Malaria vaccine	2025
Measles-containing vaccine 2nd dose	2019
Meningococcal meningitis vaccines (any strain)	2022
Mumps vaccine	Not introduced
PCV (Pneumococcal conjugate vaccine)	2014
RSV (Respiratory syncytial virus) immunization strategy	Not introduced
Rotavirus vaccine	2014
Rubella vaccine	2018
Typhoid conjugate vaccine	Not introduced

Ce tableau indique l'année d'introduction de chaque vaccin dans Togo. Si un vaccin a été suspendu, aucune année d'introduction n'est indiquée, mais s'il a été suspendu puis réintroduit, l'année de réintroduction est mentionnée. Les années d'introduction peuvent correspondre à une mise en place à l'échelle nationale, à une mise en place partielle (infranationale) ou à une introduction ciblée sur des groupes à risque spécifiques ou des zones à haut risque, comme indiqué dans les en-têtes de colonne.

Rupture des stocks de vaccins

Vaccines / supplies	2022	2023	2024	2025
BCG	National (2m) and subnational	National (1m)	National (1m) and subnational	National (4m) and subnational
OPV	National (2m) and subnational	National (2m) and subnational	National (2m) and subnational	National (5m) and subnational
PCV			National (1m)	

Ce tableau présente les ruptures de stock de vaccins infantiles relevant du WUENIC signalées au niveau national et infranational au cours des cinq dernières années. Lorsque ces informations sont disponibles, la durée des ruptures de stock au niveau national est indiquée en mois. Seuls les vaccins ayant fait l'objet d'une rupture de stock au cours de la période spécifiée sont affichés.

Une rupture de stock désigne une période pendant laquelle les points de stockage et de distribution des vaccins (par exemple, les entrepôts nationaux ou régionaux) sont complètement épuisés, y compris les stocks tampons, et ne sont pas en mesure de fournir des vaccins aux entrepôts ou aux établissements de niveau inférieur. Il est important de noter que des ruptures de stock au niveau des établissements peuvent toujours se produire même lorsque les entrepôts de niveau supérieur disposent de stocks. Les ruptures de stock, en particulier celles qui sont prolongées, peuvent avoir un impact négatif sur la couverture vaccinale.

En 2025, la couverture vaccinale a augmenté pour un antigène, est restée inchangée pour 14 autres et n'a diminué pour aucun, ce qui témoigne d'une amélioration globale des résultats de la vaccination systématique ; sept d'entre eux ont atteint une couverture d'au moins 90 %.


Cette carte thermique montre les tendances en matière de couverture vaccinale depuis 2000, les cellules vertes indiquant une couverture de 90 % ou plus.

En 2025, 7 vaccins sur les 15 (47 %) figurant dans le calendrier de vaccination ont atteint une couverture de 90 % ou plus. La couverture vaccinale variait entre 58 % et 96 %.

Depuis 2004, des estimations ont été réalisées pour 11 nouveaux vaccins. Le HPVc est le vaccin le plus récent fait l'objet d'un rapport (2023) ; il a atteint un taux de couverture de 87 % en 2025.

En 2025, le Togo a signalé des ruptures de stock de vaccins et de fournitures (BCG et OPV) (plus d'informations à la diapositive 8).

Couverture vaccinale, Togo, 2000-2025




Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025.

Note : Informations boursières disponibles depuis 2003.

Un astérisque (*) indique les endroits où il y a eu une rupture de stock de vaccins au niveau national ou infranational.

Couverture des vaccins essentiels pour les enfants, Togo, 2000-2025



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025

Ce graphique montre les tendances en matière de couverture vaccinale pour les vaccins DTC et rougeole. Il s'agit d'antigènes clés pour évaluer les programmes nationaux de vaccination.


En 2025, le taux de couverture du DTP1 (indicateur de l'accès aux services de vaccination) s'élevait à 81 %.

Le taux de couverture du DTP3 — indicateur de la qualité de la prestation des services de vaccination aux enfants par les pays — a atteint l'objectif de 90 %.

L'OMS recommande aux pays d'atteindre une couverture d'au moins 95 % avec les deux premières doses (MCV1 et MCV2) du vaccin contre la rougeole. La première dose (MCV1) assure une protection initiale, tandis que la deuxième dose (MCV2) garantit une immunité à long terme et comble les lacunes en matière de couverture vaccinale.

En 2025, la couverture vaccinale contre le MCV1 en Amérique du Nord et celle contre le MCV2 étaient inférieures à l'objectif de 95 %.


Couverture vaccinale comparée à celle des autres pays de la région, WCAR, 2025



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Remarque : Les codes ISO des pays sont affichés. La couverture (en tgo) est indiquée dans les en-têtes. La couverture moyenne régionale est représentée par la ligne pointillée.

DTP1

En 2025, la couverture vaccinale pour le DTP1 était de 95 % et celle pour le DTP3 de 90 %, ce qui laissait 29 000 enfants non vaccinés ou sous-vaccinés, dont 14 000 n'ayant reçu aucune dose et 14 000 ne bénéficiant que d'une protection partielle.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : les lignes indiquent la couverture vaccinale et les barres indiquent le nombre d'enfants.
Les enfants n'ayant reçu aucune dose sont ceux qui n'ont pas reçu le vaccin DTC1.


L'objectif principal du Programme de vaccination 2030 est de rendre la vaccination accessible à tous, partout dans le monde, d'ici 2030.

Ce graphique montre les tendances en matière de couverture vaccinale pour la première dose (DTC1) et la troisième dose (DTC3) du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose et le taux d'abandon de la vaccination DTC au Togo.

En 2025, la couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC1) au Togo est restée stable à 95 %. Le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin DTC (enfants n'ayant reçu aucune dose) est resté stable, passant de 14 000 en 2024 à 14 000 en 2025.

La couverture vaccinale contre la DTP3 est restée stable à 90 % en 2025, laissant 29 000 enfants exposés à des maladies évitables par la vaccination.


En 2025, le taux de couverture de la DTP1 au Togo s'élevait à 95 %, soit 2 points de pourcentage de plus qu'en 2019 et un niveau supérieur aux moyennes mondiales et régionales.



En 2025, la couverture vaccinale contre la DTP1 au Togo (95 %) était supérieure de 5 points de pourcentage à la moyenne mondiale (90 %) et de 14 points de pourcentage à la moyenne de l'ensemble des pays de la <keep>WCAR</keep> (81 %).


La couverture nationale du DTP1 était supérieure de 2 points de pourcentage à celle de 2019 (93 %).

Cela correspond à 14 000 enfants n'ayant reçu aucune dose en 2025, contre 19 000 en 2019.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : différence de couverture par rapport à 2019 - les valeurs supérieures à zéro indiquent une couverture supérieure à celle de 2019 et les valeurs inférieures à zéro indiquent une couverture inférieure à celle de 2019.

En 2025, le Togo figurait parmi les pays affichant la couverture la plus élevée et ne figurait pas parmi les 10 pays de la région comptant le plus grand nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : les barres sont classées par ordre croissant de couverture. Les chiffres dans les bulles indiquent le classement 10 le plus élevé en fonction du nombre absolu d'enfants zéro dose.

Ce graphique montre la couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et le polio (DTC1) dans les pays de la région WCAR, classés du plus faible au plus élevé, ainsi que le classement des 10 pays comptant le plus grand nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose, sur la base des chiffres absolus.


En 2025, le Togo se classait au 20e rang sur 24 pays pour la couverture la plus faible en matière de DTP1 (sur la base de classements ex æquo).

Le Togo ne figurait pas parmi les 10 pays comptant le plus grand nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose.

Remarque : les pays à forte cohorte peuvent compter un nombre élevé d'enfants n'ayant reçu aucune dose malgré une couverture vaccinale élevée. Il est important de tenir compte à la fois de la couverture vaccinale et du nombre absolu d'enfants non vaccinés afin de ne pas négliger les pays vulnérables dont les cohortes de naissance sont faibles.



Classement des pays selon le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose, WCAR, 2021-2025



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
 Note : le nombre entre parenthèses correspond au nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose.
 Les enfants nuls sont ceux qui n'ont pas reçu le DTC1.


Ce graphique compare le classement des pays dans <keep>WCAR</keep> en fonction du nombre absolu d'enfants n'ayant reçu aucune dose, le rang 1 représentant le pays comptant le plus grand nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose.

En 2021, le Togo occupait la 16e place sur 24 pays, avec 16 000 enfants n'ayant reçu aucune dose.

En 2025, le Togo occupait la 16e place sur 24 pays, avec 14 000 enfants n'ayant reçu aucune dose.

Remarque : le nombre absolu d'enfants n'ayant reçu aucune dose est basé sur une combinaison des résultats du programme et de la taille de la population cible d'enfants survivants. Les pays peuvent grimper dans le classement malgré une baisse du nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose, car le classement dépend également des résultats des autres pays de la région.

Il faut vacciner davantage d'enfants chaque année pour atteindre l'objectif de l'IA2030, qui consiste à réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose d'ici 2030, alors qu'on prévoit une augmentation modérée du nombre de nourrissons survivants.



IA2030 appelle tous les pays à réduire de moitié d'ici 2030 le nombre d'enfants non vaccinés en 2019. Ce graphique montre le nombre annuel d'enfants à vacciner pour atteindre l'objectif ZD.

L'initiative IA2030 appelle tous les pays à réduire de moitié d'ici 2030 le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose en 2019. Ce graphique indique le nombre annuel d'enfants devant être vaccinés pour atteindre l'objectif fixé concernant les enfants n'ayant reçu aucune dose.


Le Togo devrait connaître une augmentation modérée (10 000 à 50 000) du nombre de nourrissons survivants d'ici 2030. Par conséquent, le maintien de la couverture actuelle nécessite de vacciner un nombre croissant d'enfants.

Pour atteindre l'objectif « zéro dose » de l'IA2030, il faudra vacciner chaque année davantage d'enfants (~1,69 %) avec le DTP1. Cela nécessitera un renforcement des capacités du programme de vaccination et du système de santé.

Source : Agence nationale, révision 2025 ; Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population (2024). World Population Prospects 2024, Online Edition.
Note : L'Agenda 2030 pour la vaccination (IA2030) appelle tous les pays à réduire de moitié, d'ici à 2030, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose en 2019.

En 2025, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose dépassait de 2 % l'objectif annuel fixé par l'IA2030, ce qui rend l'objectif de 2030 tout à fait réalisable si les progrès se maintiennent.

Estimation du nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose, 2000-2025 et objectif pour 2030, Togo



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025

Remarque : Le Programme de vaccination 2030 (IA2030) appelle tous les pays à réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin en 2019 d'ici 2030. Les barres bleu foncé représentent le nombre estimé d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin entre 2000 et 2025, tandis que la barre bleu clair représente l'objectif à atteindre d'ici 2030.


La ligne et les points indiquent les progrès annuels et la trajectoire à suivre pour atteindre l'objectif d'ici 2030, sur la base d'une diminution linéaire.

IA2030 vise à ne laisser personne de côté en matière de vaccination et appelle tous les pays à réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin d'ici 2030.

- Ce graphique montre :
- Le nombre estimé d'enfants non vaccinés en 2000-2025 (barres bleu foncé)
 - L'objectif zéro dose d'ici 2030 (barre bleu clair)
 - Trajectoire pour atteindre l'objectif 2030 sur la base d'une diminution linéaire (points)

En 2025, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose était supérieur d'environ 2 % au nombre annuel prévu pour atteindre l'objectif, sur la base d'une trajectoire de baisse linéaire.

Pour que la couverture vaccinale augmente, le nombre d'enfants vaccinés doit croître à un rythme plus rapide que celui de la croissance démographique.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025

Le taux de couverture du DTP1 en 2025 (95 %) était supérieur à celui de 2019 (93 %).

Le nombre d'enfants vaccinés avec le DTP1 a augmenté de 9 % par rapport à 2019.

Le nombre de nourrissons survivants a augmenté d'environ 7 % par rapport à 2019.



En 2025, davantage d'enfants ont été vaccinés qu'en 2019.

En 2025, le nombre de nourrissons en vie (population cible) était plus élevé qu'en 2019.

Pour que la couverture vaccinale augmente, le nombre d'enfants vaccinés doit croître à un rythme plus rapide que celui de la croissance démographique.

DTP3

En 2025, le taux de couverture de la DTP3 au Togo s'élevait à 90 %, soit 2 points de pourcentage de plus qu'en 2019 et un taux supérieur aux moyennes mondiales et régionales.




Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : différence de couverture par rapport à 2019 - les valeurs supérieures à zéro indiquent une couverture supérieure à celle de 2019 et les valeurs inférieures à zéro indiquent une couverture inférieure à celle de 2019.

En 2025, la couverture du DTP3 au Togo (90 %) était supérieure de 5 points de pourcentage à la moyenne mondiale (85 %) et de 19 points de pourcentage à la moyenne de l'ensemble des pays de la WCAR (71 %).

La couverture nationale de la DTP3 était supérieure de 2 points de pourcentage à celle de 2019 (88 %).

Cela correspond à 29 000 enfants non vaccinés ou sous-vaccinés en 2025, contre 32 000 enfants non vaccinés ou sous-vaccinés en 2019.

En 2025, le Togo figurait parmi les pays affichant la couverture vaccinale la plus élevée et ne figurait pas parmi les dix pays de la région comptant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : les barres sont classées par ordre croissant de couverture. Les chiffres dans les bulles indiquent le classement 10 le plus élevé en fonction du nombre absolu d'enfants non vaccinés et sous-vaccinés.


Ce graphique montre la couverture vaccinale DTP3 dans les pays de la région WCAR, classés du plus faible au plus élevé, ainsi que le classement des 10 pays comptant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés, en chiffres absolus.

En 2025, le Togo occupait la 19e place sur 24 pays en termes de couverture vaccinale la plus faible pour la DTP3 (en cas d'ex æquo).

Le Togo ne figurait pas parmi les 10 pays comptant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés.

Remarque : les pays à forte cohorte peuvent compter un nombre élevé d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés malgré une couverture vaccinale élevée. Il est important de tenir compte à la fois de la couverture vaccinale et du nombre absolu d'enfants non vaccinés afin de ne pas négliger les pays vulnérables dont les cohortes de naissance sont faibles.

Pour que la couverture vaccinale augmente, le nombre d'enfants vaccinés doit croître à un rythme plus rapide que celui de la croissance démographique.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : Les enfants non vaccinés comprennent les enfants non vaccinés et les enfants sous-vaccinés.

Le taux de couverture du DTP3 en 2025 (90 %) était supérieur à celui de 2019 (88 %).

Le nombre d'enfants vaccinés par le DTP3 a augmenté de 9 % par rapport à 2019.

Le nombre de nourrissons survivants a augmenté d'environ 7 % par rapport à 2019.


En 2025, davantage d'enfants ont été vaccinés qu'en 2019.

En 2025, le nombre de nourrissons en vie (population cible) était plus élevé qu'en 2019.

Pour que la couverture vaccinale augmente, le nombre d'enfants vaccinés doit croître à un rythme plus rapide que celui de la croissance démographique.

MCV1

La couverture vaccinale contre la rougeole (MCV1) est restée stable à 81 % en 2025, soit un niveau inférieur aux 95 % nécessaires pour prévenir les épidémies, laissant ainsi 54 000 enfants sans aucune protection contre la rougeole. La couverture vaccinale de la deuxième campagne de vaccination (MCV2) est également restée stable à 58 %, soit un taux inférieur à l'objectif de 90 % fixé par l'IA2030.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : Les lignes indiquent la couverture vaccinale et les barres le nombre d'enfants.


En raison de sa forte transmissibilité, la rougeole agit comme un « canari dans une mine de charbon », révélant rapidement toute lacune immunitaire au sein de la population. La couverture vaccinale contre la rougeole (MCV) est donc souvent utilisée comme indicateur de protection.

Le pourcentage d'enfants ayant reçu la première dose du vaccin contre la rougeole (MCV1) – généralement à l'âge de 9 ou 12 mois, selon le calendrier national de vaccination – est resté stable à 81 %. Ce chiffre est similaire à celui de 2019, où la couverture vaccinale était de 81 %.

54 000 enfants n'ont pas reçu leur première dose de vaccin contre la rougeole dans le cadre du calendrier de vaccination systématique.

La deuxième dose du vaccin contre la rougeole (MCV2) est généralement administrée aux enfants âgés de 18 mois à 5 ans. La couverture vaccinale pour la MCV2 est restée stable à 58 % en 2025.


En 2025, le taux de couverture du vaccin MCV1 au Togo s'élevait à 81 % ; ce chiffre est identique à celui de 2019 et inférieur de 3 points de pourcentage à la moyenne mondiale (84 %).



En 2025, la couverture vaccinale contre le MCV1 au Togo (81 %) était inférieure de 3 points de pourcentage à la moyenne mondiale (84 %) et supérieure de 17 points de pourcentage à la moyenne de l'ensemble des pays de la <keep>WCAR</keep> (64 %).


La couverture nationale de la MCV1 était identique à celle de 2019 (81 %).

Cela correspond à 54 000 enfants non vaccinés en 2025, contre 51 000 enfants non vaccinés en 2019.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : différence de couverture par rapport à 2019 - les valeurs supérieures à zéro indiquent une couverture supérieure à celle de 2019 et les valeurs inférieures à zéro indiquent une couverture inférieure à celle de 2019.

En 2025, le Togo figurait parmi les pays affichant la couverture vaccinale la plus élevée et ne figurait pas parmi les dix pays de la région comptant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : les barres sont classées par ordre croissant de couverture. Les chiffres dans les bulles indiquent le classement 10 le plus élevé en fonction du nombre absolu d'enfants non vaccinés.

Ce graphique montre la couverture vaccinale contre la MCV1 dans les pays de WCAR, classés du plus faible au plus élevé, ainsi que le classement des 10 pays comptant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés, en chiffres absolus.

En 2025, le Togo occupait la 14e place sur 24 pays en termes de couverture vaccinale la plus faible contre le MCV1 (en cas d'égalité de classement).

Le Togo ne figurait pas parmi les 10 pays comptant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés.

Remarque : les pays à forte cohorte peuvent compter un nombre élevé d'enfants non vaccinés malgré une couverture vaccinale élevée. Il est important de tenir compte à la fois de la couverture vaccinale et du nombre absolu d'enfants non vaccinés afin de ne pas négliger les pays vulnérables à faible cohorte.

Pour que la couverture vaccinale augmente, le nombre d'enfants vaccinés doit croître à un rythme plus rapide que celui de la croissance démographique.

Le taux de couverture vaccinale contre le MCV1 en 2025 (81 %) était identique à celui de 2019 (81 %).


Le nombre d'enfants vaccinés par le MCV1 a augmenté de 7 % par rapport à 2019.

Le nombre de nourrissons survivants a augmenté d'environ 7 % par rapport à 2019.

En 2025, davantage d'enfants ont été vaccinés qu'en 2019.

En 2025, le nombre de nourrissons survivants (population cible) était plus élevé qu'en 2019.


Pour que la couverture vaccinale augmente, le nombre d'enfants vaccinés doit croître à un rythme plus rapide que celui de la croissance démographique.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025

En 2025, le Togo a connu une augmentation du nombre de cas de rougeole par rapport à 2024, alors que la couverture vaccinale pour la première dose (MCV1) était de 81 % et celle pour la deuxième dose (MCV2) de 58 %.

Tendances du nombre de cas de rougeole et de la couverture vaccinale MCV, Togo, 2012-2025



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025; Cas de rougeole et de rubéole signalés et taux d'incidence par les États membres de l'OMS, au 8 juillet 2025. Données provisoires basées sur les données mensuelles communiquées à l'OMS (Genève) en juillet 2025. Note : les astérisques (*) indiquent les années où il y a eu des ruptures de stock de vaccins contre la rougeole et les carets (^) indiquent les années où des campagnes de vaccination contre la rougeole ont été menées (au niveau national ou infranational).

En 2025, on a recensé au total 1 266 cas confirmés de rougeole au Togo. La même année, la couverture vaccinale contre la rougeole (MCV1) était de 81 % et celle contre la rougeole (MCV2) de 58 %.

Le nombre de cas en 2025 était 3,2 fois supérieur à celui de 2024 (n = 392).

C'est en 2025 que le nombre de cas de rougeole a été le plus élevé (n = 1 266). Cette année-là, la couverture vaccinale de la première dose (MCV1) était de 81 %.


Le Togo a signalé des ruptures de stock de vaccins contre la rougeole en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 et 2014.

Des activités ou campagnes de vaccination d'appoint à base de vaccins contenant le virus de la rougeole ont été menées en 2022 et 2025.


Vaccination des enfants : Tableaux supplémentaires

Abandon de la vaccination, Togo, 2000-2025

DTC1 et DTC3




DTC1 et MCV1



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Classification des abandons : < 5 % = faible, 5-10 % = moyen, > 10 % = élevé

En 2025, le taux d'abandon entre la DTP1 et la DTP3 était modéré (5 %) et celui entre la DTP1 et le MCV1 élevé (15 %) au Togo, ce qui indique une capacité modérée à administrer la série primaire dès le début, mais une faible capacité à assurer le cycle complet de vaccination pendant la petite enfance.



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : Les lignes indiquent la couverture vaccinale et les barres le nombre d'enfants.

Les taux d'abandon indiquent le pourcentage d'enfants qui ont reçu le DTC1, mais pas le DTC3/MCV1. De faibles taux d'abandon indiquent un taux élevé de rétention des enfants dans les programmes de vaccination.


Ce graphique montre les tendances des taux d'abandon entre le DTC1 et le DTC3, et entre le DTC1 et le MCV1.

En 2025, 5 % des enfants ayant reçu le DTC1 n'ont pas reçu le DTC3 (à gauche), et 15 % des enfants ayant reçu le DTC1 n'ont pas reçu le MCV1 (à droite).

Les taux moyens d'abandon du DTP indiquent une capacité modérée à administrer une série complète de vaccins dès le plus jeune âge. Les taux élevés d'abandon du DTP-MCV indiquent une faible rétention dans les programmes de vaccination et une capacité insuffisante à administrer une série complète de vaccins pendant la petite enfance (jusqu'à un an).

En 2025, le Togo affichait le taux de couverture le plus faible pour le vaccin MCV2 (58 %), tandis que la plupart des autres vaccins de routine se situaient entre 80 et 96 % ; six antigènes ont connu une hausse depuis 2019, et huit antigènes sont restés stables depuis 2024.

Couverture vaccinale recommandée pour les enfants, Togo, 2000-2025



Ce graphique montre les tendances en matière de couverture vaccinale pour certains vaccins de routine recommandés pendant l'enfance.


En 2025, le MCV2 affichait la couverture la plus faible (58 %), suivi du YFV (80 %).

Par rapport à 2019, la couverture vaccinale d'un vaccin a diminué (BCG), celle de six vaccins a augmenté (DTP1, DTP3, IPV1, MCV2, ROTAC et YFV) et celle d'un vaccin est restée stable (MCV1).

Par rapport à 2024, la couverture vaccinale de huit vaccins est restée stable (BCG, DTP1, DTP3, IPV1, MCV1, MCV2, ROTAC et YFV).

Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : les libellés des données sont indiqués pour 2000 (ou la première année de déclaration), 2019 et 2025.

Couverture vaccinale (%), Togo, 2000-2025




Ce graphique présente l'évolution de la couverture vaccinale pour 10 vaccins (série complète).

En 2025, le MCV2 affichait la couverture la plus faible de tous les vaccins (58 %), suivi de l'IPVC (69 %).

La couverture vaccinale de 6 vaccins a augmenté (DTP3, HEPB3, HIB3, IPV1, MCV2 et ROTAC) et celle de 2 vaccins est restée inchangée (MCV1 et RUBELLA) par rapport à leur couverture respective en 2019.

La couverture de 9 vaccins est restée inchangée (DTP3, HEPB3, HIB3, IPV1, IPVC, MCV1, MCV2, ROTAC et RUBELLA) et celle d'un vaccin a augmenté (HPVC) par rapport à leur couverture respective en 2024.

Couverture vaccinale (%), Togo, 2019-2025



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025

Note : la barre grise représente la couverture vaccinale pour toutes les années 2019-2025 et les points représentent la couverture pour des années spécifiques.

La couverture est indiquée pour les vaccins pour lesquels des données sont disponibles pour toutes les années 2019-2025.

Les noms des vaccins sont colorés en fonction de leur couverture par rapport à celle de 2019 : inférieure (rouge), identique (bleu) ou supérieure (vert).

Ce graphique montre la couverture vaccinale pour toutes les années comprises entre 2019 et 2025 (barres grises) et la couverture pour des années spécifiques (points), par vaccin. Il peut être utilisé pour évaluer le retour aux niveaux d'avant la pandémie.

Le taux de couverture du DTP1 a augmenté entre 2019 (93 %) et 2024 (95 %). En 2025, ce taux est resté inchangé (95 %) par rapport à 2024, et était supérieur à celui de 2019. Entre 2019 et 2025, la couverture vaccinale du DTP1 a atteint son niveau le plus bas en 2020 (92 %).

En 2024, 1 vaccin présentait une couverture inférieure à celle de 2019.

En 2025, 1 vaccin présentait une couverture inférieure à celle de 2019.

En 2025, aucun vaccin ne présentait une couverture inférieure à celle de 2024.




WUENIC 2025 revision

HPV vaccination

Méthodes: • [Bruni et al. 2021, HPV vaccination introduction worldwide and WHO and UNICEF estimates of national HPV immunization coverage 2010–2019 \(supplementary materials\).](#)

En 2025, le taux de couverture vaccinale contre le HPV (dernière dose) chez les filles a atteint 87 %, après la mise en place d'un schéma vaccinal à dose unique lors de l'introduction du vaccin en 2023.



La première année pour laquelle des estimations de la couverture vaccinale contre le HPV ont été établies au Togo était 2023.


En 2025, la couverture vaccinale pour la première dose (HPV1) chez les filles était de 87 %. En 2025, la couverture vaccinale pour la dernière dose (HPVc) chez les filles était de 87 %.

Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
ans le calendrier, mais que le pays n'a pas communiqué de données pour une année donnée, les estimations de la couverture du programme anti-papillomavirus ne sont pas produites.

SDG 3.b.1

En 2025, le Togo a atteint l'objectif de couverture de 90 % fixé par les ODD pour le DTP3, mais pas pour les autres vaccins.

ODD 3.b.1 : Proportion de la population cible couverte par tous les vaccins inclus dans leur programme national, Togo, 2000-2025



Source : Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale, révision 2025
Note : les quatre indicateurs de couverture vaccinale qui contribuent à l'indicateur 3.b.1 des ODD sont les suivants : DTC3, MCV2, PCVC et HPVc
L'objectif mondial du Programme d'immunisation 2030 (IA2030) est d'atteindre une couverture de 90 % pour les quatre antigènes d'ici 2030.

Quatre indicateurs de couverture vaccinale contribuent à l'Objectif de développement durable 3, indicateur b.1 : DTC3, PCVC, MCV2 et HPV.


L'objectif mondial IA2030 est une couverture de 90 % des quatre antigènes d'ici 2030.

Le Togo dispose des quatre vaccins relevant des ODD.

En 2025, le Togo avait atteint une couverture d'au moins 90 % pour l'un des quatre vaccins.

Ressources supplémentaires

WUENIC country profiles
(PDF and interactive versions)




Datasets:
WUENIC, HPV, survey database

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	unicef_regioiso3c	country	vaccine	year	target_grp	coverage	vaccinated	unvaccinated	target	
1	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1982	births	10	57,000	514,000	571,000	
2	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1983	births	10	56,000	503,000	559,000	
3	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1984	births	11	62,000	501,000	563,000	
4	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1985	births	17	100,000	490,000	591,000	
5	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1986	births	18	107,000	489,000	596,000	
6	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1987	births	27	161,000	434,000	595,000	
7	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1988	births	40	238,000	358,000	596,000	
8	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1989	births	38	233,000	380,000	614,000	
9	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1990	births	30	191,000	446,000	637,000	
10	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1991	births	21	134,000	505,000	640,000	
11	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1992	births	19	127,000	541,000	668,000	
12	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1993	births	17			760,000	
13	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1994	births	15			852,000	
14	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1995	births				899,000	
15	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1996	births				932,000	
16	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1997	births				962,000	
17	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1998	births				986,000	
18	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	1999	births				1,013,000	
19	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	2000	births	30			1,037,000	
20	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	2001	births	43	453,000	374,000	1,007,000	
21	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	2002	births	46	467,000	548,000	1,015,000	
22	ROSA	AFG	Afghanistan bcg	2002	births					

Country and region-specific slides:

UNICEF, WHO, World Bank, Gavi and
African Union regions




Interactive immunization regional
snapshots:

UNICEF, WHO, World Bank, Gavi and
African Union regions




Country data quality reports

(NEW 2026)



Country and region-specific
high-level talking points

(NEW 2026)



Ressources
supplémentaires

Vous trouverez
d'autres
sources
d'informations
sur la
vaccination à
l'adresse
suivante :
<https://data.unicef.org/resources/immunization/>

Les profils
interactifs des
pays du
WUENIC sont
disponibles à
l'adresse
suivante :



Questionnaire de satisfaction

(5 minutes)

Nous souhaitons connaître votre avis sur les regroupements mondiaux (GAVI, Union africaine, Banque mondiale, OMS et UNICEF) et les diapositives PowerPoint par pays élaborés pour la publication des estimations mondiales en matière de vaccination. Vos commentaires nous aideront à comprendre leur utilité et à identifier les points à améliorer.

Merci de prendre quelques instants pour répondre à cette courte enquête et faire entendre votre voix :

<https://forms.office.com/e/Qv1HXxxNZQ>

