
نقاط نقاش الـ WUENIC: دولة فلسطين 🇵🇸


سنة المراجعة: 2025



نظرة عامة

- يتم تتبع ما مجموعه 13 لقاحًا للأطفال في دولة فلسطين؛ ومن بينها، حقق 12 هدف التغطية البالغ 90% أو أكثر في 2025.
- نسبة تغطية الجرعة الأولى من اللقاح المحتوي على الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (DTP1) كان في 2025 كما كان في 2024 (99٪)، تغطية الجرعة الثالثة من اللقاح الذي يحتوي على DTP (DTP3) كان في 2025 كما كان في 2024 (99٪)، وتغطية الجرعة الأولى من اللقاح المحتوي على الحصبة (MCV1) انخفض من 99% في 2024 إلى 98% في 2025 في 2025.
- في 2025، بلغ عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة من لقاح DTP في دولة فلسطين (1,000) حوالي 35٪ أعلى من العدد السنوي المقترح لتحقيق هدف IA2030 المتمثل في خفض عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة من لقاح DTP إلى النصف بحلول عام 2030 (1,000)، استنادًا إلى مسار انخفاض خطي.






Source: WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage, 2025 revision.
Note: The Immunization Agenda 2030 (IA2030) calls on all countries to reduce the number of zero-dose children in 2019 in half by 2030.
Dark blue bars are the estimated number of zero-dose children in 2000–2025,
light blue bar is the target number of zero-dose children by 2030.
The line and points show the yearly progress and trajectory to meet the target by 2030, based on a linear decline.


DTP1: الوصول إلى الأطفال غير المحصنين (جرعة صفرية)

- بلغت نسبة التغطية لـ DTP1 99% في 2025. وهذا يماثل النسبة المسجلة في 2019 (99٪) ويماثل أيضًا النسبة المسجلة في 2024 (99٪).
- كانت النسبة المئوية للأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة أعلى بـ 35 نقطة مئوية عن الهدف المحدد في خطة IA2030 في عام 2025. بلغ عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة في عام 2025 حوالي 1,000 طفلاً، وهو عدد أقل من 1,000 في عام 2019، لكنه أكبر من 1,000 في عام 2024.
- بلغت نسبة التغطية بالتطعيم DTP1 في دولة فلسطين (99٪) نسبةً أعلى من المتوسط الإقليمي لـ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 89٪ في عام 2025.
- بلغ معدل التسرب من DTP1 إلى DTP3 في عام 2025 0٪، كما في 2019. تشير معدلات التسرب المنخفضة لـ DTP إلى قدرة جيدة على توفير سلسلة لقاحات كاملة في مرحلة مبكرة من العمر.




DTP3: مؤشر على تقديم خدمات التحصين الروتينية للأطفال

- بلغت نسبة التغطية لـ DTP3 99% في 2025. وهذا يماثل النسبة المسجلة في 2019 (99٪) ويماثل أيضًا النسبة المسجلة في 2024 (99٪).
- انخفض عدد الأطفال الذين تلقوا لقاح DTP3 من 144,000 في عام 2019 إلى 141,000 في عام 2025.
- في عام 2025، كان هناك 1,000 طفلاً لم يتلقوا التطعيم أو لم يكملوا الجرعات المطلوبة في دولة فلسطين.
- في عام 2025، لم يتلقَّ 0٪ من الأطفال الذين تلقَّوا DTP1 لقاح DTP3. وكان معدل التسرب البالغ 0% هو نفسه الذي سُجل في 2019 (0%)، كما كان مماثلاً لمعدل التسرب في 2024 (0%).
- بلغت نسبة التغطية بالتطعيم DTP3 في دولة فلسطين (99٪) نسبةً أعلى من المتوسط الإقليمي لـ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 83٪ في عام 2025.



لقاح الحصبة: جرس الإنذار المبكر

- بلغت نسبة التغطية لـ MCV1 98% في عام 2025. وهذا أقل مما كان عليه في 2019 (99٪) وأقل مما كان عليه في 2024 (99٪).
- نسبة تغطية الجرعة الثانية من اللقاح المحتوي على الحصبة (MCV2) ظل مستقرًا نسبيًا، في نطاق نقطة مئوية واحدة من مستوى 2019. وهذا يترك 3,000 طفلاً دون أي حماية ضد الحصبة، و-1,000 آخر يحظى بحماية جزئية فقط.
- في 2025، لم يتلقَّ 1٪ MCV1 من الأطفال الذين تلقَّوا DTP1. وكان معدل التسرب هذا البالغ 1٪ أعلى بـ 1 نقطة مئوية مقارنةً بـ 2019 (0٪) وأعلى بـ 1 نقطة مئوية من معدل التسرب 2024 (0٪).
- حققت دولة فلسطين تغطية بلغت MCV1، متجاوزةً عتبة 80٪ على مدار السنوات 3 الماضية.
- بلغت نسبة التغطية بالتطعيم MCV1 في دولة فلسطين (98٪) نسبةً أعلى من المتوسط الإقليمي لـ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 84٪ في عام 2025.




فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

- لم تكن State of Palestine قد بدأت في تطبيق برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) حتى عام 2025.


المقارنة الإقليمية

يوضح الرسم البياني أدناه مقارنة دولة فلسطين بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدلات التغطية بلقاحات DTP1 وDTP3 وMCV1 في عام 2025. يمثل الخط المتقطع المتوسط الإقليمي لكل لقاح.



اللقاحات الإضافية

- بلغت نسبة تغطية BCG 98% في 2025. وهذا أقل مما كان عليه في 2019 (99٪) وأقل مما كان عليه في 2024 (99٪).
- بلغت نسبة تغطية HepB3 99% في 2025. وهذا يماثل النسبة المسجلة في 2019 (99٪) ويماثل أيضًا النسبة المسجلة في 2024 (99٪).
- بلغت نسبة تغطية Hib3 99% في 2025. وهذا يماثل النسبة المسجلة في 2019 (99٪) ويماثل أيضًا النسبة المسجلة في 2024 (99٪).
- بلغت نسبة تغطية IPV1 98% في 2025. وهذا أقل مما كان عليه في 2019 (99٪) وأقل مما كان عليه في 2024 (99٪).
- بلغت نسبة تغطية PCVC 99% في 2025. وهذا يماثل النسبة المسجلة في 2019 (99٪) ويماثل أيضًا النسبة المسجلة في 2024 (99٪).
- بلغت نسبة تغطية RotaC 83% في 2025. وهذا أقل مما كان عليه في 2019 (99٪) وأقل مما كان عليه في 2024 (97٪).



الملحق

تقديرات منظمة الصحة العالمية واليونيسف للتغطية التحصينية الوطنية (WUENIC)

تقوم منظمة الصحة العالمية واليونيسف كل عام بمراجعة بيانات التحصين الوطنية من الدول الأعضاء، بما في ذلك التغطية الإدارية والرسمية، وتقديرات المسوح والمعلومات السياقية، وتستخدمان نهجاً قائماً على القواعد لتثليث البيانات لتقييم التغطية. تُنتج التقديرات بشكل مستقل، دون استعارة بيانات من بلدان أخرى، ولا تستند إلى تعديلات مخصصة. وفي بعض الحالات، تعتمد على مصدر واحد، وعادة ما يكون التغطية المبلغ عنها وطنياً. وعندما لا تتوفر بيانات لسنة معينة خاصة ببلد ولقاح معينين، يتم استقراء القيم من السنوات المجاورة أو تقديرها خارجياً، ويتم تقييم المصادر المتعارضة لتحديد التقدير الأكثر موثوقية، مع مراعاة التحيزات المحتملة ورأي الخبراء.

الطرق والأساليب

- Burton et al. 2009. WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes
- Burton et al. 2012. A formal representation of the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage: a computational logic approach
- Brown et al. 2013. An introduction to the grade of confidence used to characterize uncertainty around the WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage

تقدم هذه النقاط الرئيسية أحدث تقديرات شبكة WUENIC (التي نُشرت في 15 يوليو 2026).

تعاريف مصطلحات التحصين:

- عصيات كالميت غيران (BCG): اللقاح المضاد للسل
- جرعة الولادة لالتهاب الكبد البائي، تُعطى خلال 24 ساعة بعد الولادة (HepBB)
- لقاح الدفتيريا والكزاز والشاهوق، الجرعة الأولى (DTP1) والجرعة الثالثة (DTP3)
- لقاح التهاب الكبد البائي، الجرعة الثالثة (HepB3)
- لقاح المستدمية النزلية من النوع ب، الجرعة الثالثة (Hib3)
- لقاح شلل الأطفال المعطل، الجرعة الأولى (IPV1) والجرعة الأخيرة (IPVC)
- اللقاح المحتوي على الحصبة، الجرعة الأولى (MCV1) والجرعة الثانية (MCV2)
- لقاح فيروس الروتا، الجرعة الأخيرة (RotaC)
- لقاح المكورات الرئوية، الجرعة الأخيرة (PCV)
- لقاح الحمى الصفراء (YFV)
- لقاح المكورات السحائية أ (MengA)
- لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، الجرعة الأولى (HPV1) والجرعة الأخيرة (HPVc)

موارد إضافية:

/https://data.unicef.org/resources/immunization